

PACHET AMBULATOR

I. Obiective

1. *Diminuarea internarilor in spitalizare continua*
2. *Rezolvarea episoadelor de ingrijire la nivelul ambulatorului de specialitate prin optimizarea resurselor/cost-eficacitate*
3. *Cresterea accesului populatiei la servicii medicale*
4. *Eficientizarea calitatii serviciilor acordate prin coordonarea ingrijirii*
5. *Optimizarea timpului de ingrijire*

II. Definitii – tipuri de consultatii:

1. **Consultatie scurta** (consultatia de nivel A): ingrijirea pentru o problema certa, in relatie cu una sau mai multe boli, pentru care se aplica deja un plan de management, caracterizata prin sarcini simple ce includ oricare din urmatoarele:

- Istorie scurta a evolutiei bolii pacientului
- Examinare clinica limitata
- **Management limitat al bolii** (ex. prescriere medicatie, concediu medical, urmarire indicatii igieno-dietetice, bilet trimitere ambulator/spital conform planului initial de management)
- Inregistrare informatii clinice in dosarul pacientului
- Durata medie a consultatiei este de 5 minute
- Consultatia poate fi la cabinet sau la domiciliu

Se efectueaza atat de catre medicul de familie cat si de catre medicul specialist

2. **Consultatie standard** (consultatia de nivel B)

B1: *ingrijirea pentru o problema care nu este certa, in relatie sau nu cu una sau mai multe boli preexistente, incluzand cel putin 2 din urmatoarele:*

- **Anamneza detaliata**
- **Examinarea clinica specifica specialitatii** (inclusiv manevrele uzuale din practica curenta)
- **Stabilirea planului de investigatii** cu interpretare
- **Stabilirea planului de management al bolii**, inclusiv acte de suport(prescriptie,concediu medical,scrisoare medicala)
- **Inregistrarea detaliilor clinice in dosarul pacientului**

PACHET AMBULATOR

B2: *ingrijirea pentru monitorizarea pacientului cu una sau mai multe afectiuni cronice de lunga durata, pentru care exista o periodicitate mentionata in planul de management, incluzand: bilantul starii de sanatate; ex clinic; investigatii; urmarirea si/sau actualizarea planului de management; acte de suport.*

- Durata medie a consultatiei este de 20 minute

3. Consultatia lunga sau complexa (consultatia de nivel C): *ingrijirea pentru o problema care nu este certa, in relatie sau nu cu una sau mai multe boli preexistente, incluzand oricare din urmatoarele:*

- Anamneza detaliata
- Examinarea clinica specifica specialitatii/specialitatilor
- Stabilirea planului de investigatii si interpretare
- Stabilirea si implementarea planului de management al bolii, care va fi transmis si medicului de familie, inclusiv acte de suport (prescriptie medicala, concediu medical, scrisoare medicala)
- Acordarea de ingrijiri preventive si consiliere specifica specialitatii
- Inregistrarea detaliilor clinice

Durata medie a consultatiei este de 40 minute

Frecventa consultatiilor:

1. *Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultație inițiala, 1 consultatie de control)*
2. *Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an*

*exceptiile vor fi mentionate la rubrica frecventa/plafon

Criteriile de eligibilitate prezentate pentru consultatiile din ambulatoriul de specialitate vor orienta acordarea serviciilor medicale la acest nivel fara a se limita la afectiunile exemplificate in sectiunea III. punctul A. Consultatii.

PACHET AMBULATOR

III. DETALIERE PE SPECIALITATI MEDICALE SI CHIRURGICALE

A. CONSULTATII:

1. Alergologie și imunologie clinică

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate-prioritate pentru trimiteri din asistența primară</i>	<i>Frecvența/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii Consultatia cuprinde si educarea pacientului/familiei	<p><u>Nivel 1: maxim 1 luna</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Istoric recent de anafilaxie /lipsa planului de management •Suspiciune de rash cutanat vasculitic •Boala auto-imuna activa fara semne de afectare a organelor tinta <p><u>Nivel 2: maxim 3 luni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Istoric de anafilaxie la agenti cunoscuti / elaborarea planului de management •Trimitere pentru desensibilizare •Urticaria acuta recurenta sau care nu cedeaza la tratamente uzuale •Evaluarea bolilor auto-imune fara afectare a organelor-tinta <p><u>Nivel 3: maxim 6 luni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Evaluare si management in rinita alergica •Evaluare a imunoterapiei legat de aero-alergeni 	<p><i>Pentru boala acuta:</i> 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</p> <p><i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i></p>	

PACHET AMBULATOR

		<ul style="list-style-type: none"> •Alergii medicamentoase sau de contact la agenti cunoscuti evitabili •Evaluare si management in urticarial cronica •Alergia alimentara ne-anafilactoida •Suspiciune de imunodeficienta in absenta complicatiilor •Evaluarea autoanticorpilor la asimptomatici 		
--	--	---	--	--

2. Boli infectioase

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii *conform criterii boli infectioase	Sindrom febril prelungit Febra si rush Infectia HIV - se trimite pentru confirmare diagnostic si luare in evident, monitorizare Afectare hepatica acuta la persoane HIV pozitive - se trimite pentru confirmare diagnostic si luare in evident, monitorizare Infectia hepatica virala – pentru confirmare diagnostic si luare in evident, monitorizare	<i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i> <i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i>	

PACHET AMBULATOR

		<p>Infectii complexe ale maduvei spinarii, organelor transplantate, implanturilor</p> <p>Infectii complexe la niv tesuturilor si sistemului musculoscheletic</p>		
--	--	--	--	--

3. Cardiologie

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii	<p><u>Nivel 1: în maxim 14 zile</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Stenoza aortică simptomatică •Hipertensiunea arterială severă și refractară la tratament •Boala cardiovasculară la gravidă <p><u>Nivel 2: în maxim 1 lună</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Insuficiența cardiacă NYHA IV •Angina pectorala CSC 3 si 4 •Boala valvulară simptomatică •Deteriorare functionala recenta in insuficienta cardiaca aflata sub tratament •Fibrilatia atriala nou descoperita 	<p><i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i></p> <p><i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i></p>	

PACHET AMBULATOR

		<ul style="list-style-type: none"> •BAV grd 2 si 3 •Sulflu cardiac nou aparut la pacient cardiovascular cunoscut •Suspiciunea de HTAE malignă <p><u>Nivel 3: în maxim 3 luni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sufluri/ cardiomegalie asimptomatice nou descoperite •Suspiciunea de hipertensiune arterială secundară/ HTAE rezistentă la tratament •Tulburari de ritm nou instalate cu/fara semne de afectare hemodinamica si /sau de afectare structurala cardiacă 		
--	--	---	--	--

4. Chirurgie cardiovasculară

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii		<i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i> <i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i>	* pentru urmatoarele diagnostice consultatiile se vor acorda dupa cum urmeaza: 1. (I65.2) Ocluzia si stenoza arterei carotide <i>In primul an postoperator de 5 ori pe an, in al doilea an de 2 ori pe an si incepand</i>

PACHET AMBULATOR

				<p><i>din al treilea an 1 data pe an si de 2 ori pe an in cazul stenozelor fara indicatie operatorie.</i></p> <p>2.(I70.21)Ateroscleroza arterelor extremitatilor cu claudicatie intermitenta: <i>in primul an postoperator de 5 ori pe an, in al doilea an de 2 ori pe an si incepand din al treilea an 1 data pe an; la pacientii neoperati de 2 ori pe an.</i></p> <p>3. (I70.22) Ateroscleroza arterelor extremitatilor cu durere la repaos: <i>in primul an postoperator de 5 ori pe an, in al doilea an de 2 ori pe an si incepand din al treilea an 1 data pe an.</i></p> <p>4. (I70.22) Ateroscleroza arterelor extremitatilor cu ulceratie: <i>in primul an postoperator de 5 ori pe an, in al doilea an de 2 ori pe an si incepand din al treilea an 1 data pe an.</i></p> <p>5. (I70.24)Ateroscleroza arterelor extremitatilor cu gangrene: <i>in primul an postoperator de 5 ori pe an, in al doilea an de 2 ori pe an si incepand din al treilea an 1 data pe an.</i></p> <p>6. (I71.2) Aneurismul toracic, fara mentiunea rupturii: <i>in primul an postoperator de 5 ori pe an, in al doilea an de 2 ori pe an si incepand din al treilea an 1 data pe an; la cei neoperati de 2 ori pe an.</i></p> <p>7. I71.4 Aneurismul abdominal, fara mentiunea rupturii: <i>in primul an</i></p>
--	--	--	--	---

PACHET AMBULATOR

				<p><i>postoperator de 5 ori pe an, in al doilea an de 2 ori pe an si incepand din al treilea an 1 data pe an; la cei neoperati de 2 ori / an</i></p> <p>8. (I73.1) Trombangeita obliteranta [Buerger]: <i>In primul an postoperator de 5 ori pe an, in al doilea an de 2 ori pe an si incepand din al treilea an 1 data pe an</i></p> <p>9. (I 74.0) Embolia si tromboza aortei abdominale <i>in primul an postoperator de 5 ori pe an, in al doilea an de 2 ori pe an si incepand din al treilea an 1 data pe an</i></p> <p>10. (I 74.2) Embolia si tromboza arterelor extremitatilor superioare <i>in primul an postoperator de 5 ori pe an, in al doilea an de 2 ori pe an si incepand din al treilea an 1 data pe an.</i></p> <p>11. (I74.3) Embolia si tromboza arterelor extremitatilor inferioare <i>in primul an postoperator de 5 ori pe an, in al doilea an de 2 ori pe an si incepand din al treilea an 1 data pe an.</i></p> <p>12. I77.0) Fistula arterio-venoasa, dobindita: <i>in a 2-a saptamana postoperatoriu, in a 6-a saptamana postoperatoriu si ulterFior de 2 ori/an.</i></p>
--	--	--	--	---

PACHET AMBULATOR

5. Chirurgie generală

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii	<p><u>Nivel 1: maxim 14 zile</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Hernii ireductibile •Colecistita acuta litiazica fara febra •Chisturi cervicale cu fenomene inflamatorii •Abces perianal •Simptomatologie sugestiva pentru obstructie progresiva •Formatiuni palpabile abdominale de natura suspecta •Istoric de rectoragii sugestive penru cauze chirurgicale •Dureri sugestive pentru diverticulita acuta •Neoplazii ale tractului gastro-intestinal <p><u>Nivel 2 maxim 1 luna</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Boala pilonidala cronica/ recurenta •Chisturi cervicale fara fenomene inflamatorii • Patologie ano-rectala insotita de dureri la defecatie • Boala hemoroidala std III si IV 	<p><i>Pentru boala acuta:</i> <i>2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i> <i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i></p>	

PACHET AMBULATOR

		<p><u>Nivel 3: maxim 3 luni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fistula perianala • Colecistita litiazica simptomatice • Unghia incarnata • Incontinenta fecala 		
--	--	--	--	--

6. Chirurgie pediatrică

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii		<p><i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i></p> <p><i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i></p>	

7. Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii	<p><u>Nivel 1 urgent maxim 2 saptamani – 1 luna</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Suspiciunea sau leziunea dovedita de melanom malign • Alte leziuni canceroase la 	<p><i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i></p> <p><i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i></p>	<p>* pentru urmatoarele diagnostice consultatiile se vor acorda dupa cum urmeaza:</p> <p>1. (T30) Arsura cu</p>

PACHET AMBULATOR

		<p>nivelul fetei</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afectiuni severe ale fetei • Arsuri cu prezentare tardivă <p>Pierderi de tesut moale cu prezentare tardivă</p> <p><u>Nivel 2 Semiurgent Maxim 1-2 luni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Leziuni cutanate, altele decat melanomul sau alte leziuni cutanate care cresc incet • Afectiuni care se suprainfecteaza – chiste etc • Anomalii congenital nedepistate la nastere – sindactilie, hipospadias etc <p>Cicatrici vicioase care limiteaza functionalitatea normala</p> <p><u>Nivel 3 de Rutina Maxim 3 luni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Leziuni cutanate benign • Lipoame • Nevi nonmelanocitari • Chiste • Cicatrici vicioase care nulimiteaza functionalitatea normal 		<p>adancime partiala si toata grosimea: 10 consultatii</p> <p>2. Malformatii congenitale la nivelul mainii sindactilii (Q70), polidactilii (Q69), maladii amniotice): 7 consultatii</p> <p>3. Malformatii congenitale la nivelul pavilionului auricular: 7 consultatii</p> <p>5. Malformatii congenitale ale fetei (Q), buzei si palatului (Q 35): 6 consultatii</p> <p>6. (S01.4, S01.5) Plagi deschise la nivelul fetei: 5 consultatii</p> <p>7. Leziune nerv la nivel antebrat si mana: 7 consultatii</p> <p>8. (S68.1, S68.2) Amputatie deget mana: 5 consultatii</p>
--	--	--	--	--

PACHET AMBULATOR

--	--	--	--	--

8. Chirurgie toracică

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii		<i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i> <i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i>	

9. Dermatovenerologie

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii	<u>Nivel 1: 1-Urgent</u> <u>maxim 14 zile</u> <ul style="list-style-type: none"> • Eritrodermii • Pemfigus bulos • Fitofotodermatoze cu leziuni extinse 	<i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i>	* pentru urmatoarele diagnostice consultatiile se vor acorda dupa cum urmeaza: L.10 –L.14 Dermatoze

PACHET AMBULATOR

		<ul style="list-style-type: none"> •toxidermiile postmedicamentoase •eczeme generalizate •hemangioame ulcerate •Eczema herpetica Urticaria acuta severa care nu raspunde la tratament <p><u>Nivel 2: Semi-urgent</u> maxim 2 luni:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Tinea capitis •Eczema impetigiinzata •Nevi melanici congenitali gigantici •Dermatite acute de contact •Suspiciune cancer cutanat Alopecia <p><u>Nivel 3-Rutina Maxim 6 luni</u></p>	<p><i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i></p>	<p>buloase (pemfigoid bulos, si altele – cu exceptia Pemfigus vulgar), boala Duhring - L13.0 : 12 consultatii lunare</p>
--	--	---	--	--

PACHET AMBULATOR

10. Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii		<i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control) Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i>	
2.proceduri				

11. Endocrinologie

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii	<p>Nivel 1 Urgent - Maxim 1 luna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tulburari ale metabolismului fosfo-calcic – Suspiciunea de hipo-hiperparatiroidism • Suspiciunea de tulburari hipofizare • Suspiciunea de disfunctie a suprarenalei (Cushing sau Addison) • Oftalmopatia progresiva • Suspiciunea de HTA endocrina • Hirsutism progresiv cu masculinizare, trasaturi Cushingoide si testosterone plasmatic > 5 mmoli/L • Neutropenie pe fond de tratament cu antitiroidiene de sinteza • Suspiciune de hiperprolactinemie 	<i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control) Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i>	

PACHET AMBULATOR

		<p>(galactoree, amenoree/ disf erectila) Polidipsie-poliurie cu simptome severe</p> <p><u>Nivel 2 - semiurgent Maxim 3 luni</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Evaluarea complexa a hipertiroidismului nou diagnosticat• Hipertiroidismul recurent, cu raspuns therapeutic inadecvat si/sau intoleranta la tratament• Osteoporoza la: barbati, femei tinere, suspecti de hiperparatiroidism sau alte boli ale metabolismului osos , tratament cu glucocorticoizi• Tulburari de crestere (nanism/gigantism, acromegalie)• Suspiciunea de hipogonadism prin insuficienta hipofizara <p>Polidipsie-poliurie cu simptome usoare.</p> <p><u>Nivel 3 Rutina maxim 6 luni</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Hirsutism fara semne de impregnare androgenica progresiva• Suspiciunea de hipogonadism 15asculine <p>Amenoree secundara</p>		
--	--	--	--	--

PACHET AMBULATOR

12. Gastroenterologie

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii	<p><u>Nivel 1: 1-Urgent Maxim 1 luna</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Anemie feripriva recenta de cauza inexplicabila • Suspiciune de stenoza pilorica • Test pozitiv pentru Hemoagia oculta in fecale • Radiologie sugestiva pentru polipi sau ulcere gastrice maligne • Suspiciune de boala inflamatorie intestinala in puseu • Disfagia • Colonul Iritabil cu manifestari severe • Episod anamnetic de hemoragie digestiva recenta • Rectoragie documentat • Diareea persistenta (> 2 saptamani) si cronica (> 6 saptamani) cu rasunet functional • Sindromul dispeptic insotit de semne de alarma: anemie, scadere ponderala involuntara, anorexie, voma, varsta >50 ani <p>Simptomatologie pancreatico-biliara nechirurgicala</p> <p><u>Nivel 2- semiurgent Maxim 3 luni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sindrom dispeptic fara semne de alarma • Sindroame de malabsorbtie • Diareea cronica • Scadere ponderala involuntara/ stari de voma inexplicabile • Modificari de tranzit la persoane > 40 ani si/sau 	<p><i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i></p> <p><i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i></p>	<p>Pentru urmatoarele diagnostice consultatiile se vor acorda dupa cum urmeaza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. K.70 - Ciroza hepatica: 12 consultatii/an 2. B 18.2 - Hepatita virala cronica C: 12 consultatii/an 3. B 18.0 B18.1 Hepatita cronica virala B (HVB): 12 consultatii/an

PACHET AMBULATOR

		<p>semne de alarma/ rezultate anormale la explorari de rutina si/sau istoric familial sugestiv Modificare asimptomatica a testelor functiei hepatice</p> <p><u>Nivel 3 Rutina maxim 6 luni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Supravegherea cancerelor familiale •Suspiciunea de Colon iritabil •Investigarea durerii toracice necardiace/ tusea cronica nerespiratorie <p>Suspiciunea de sdr de malabsorbtie</p>		
--	--	--	--	--

13. Genetică medicală

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	<p>*conform capitol definitii</p> <p>Sfat si consiliere genetica.</p>	<p><u>Nivel 2 semiurgent Maxim 1 luna</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Istoric familial care necesita testare prenatala <p><u>Nivel 3 de rutina - Maxim 6 luni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Planificarea conceptiei intr-un cuplu in care exista istoric familial de mutatie genetica •Evaluarea riscului individual pentru persoane cu istoric familial de 		

PACHET AMBULATOR

		mutatie genetica (mucoviscidoza, talasemie, surditate, acondroplazie, distrofie musculara, sdr Down, cancere familiale etc) Persoane cu avorturi repetate		
--	--	--	--	--

14. Geriatrie și gerontologie

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii	<p><u>Nivel 2: semiurgenta Maxim 2 luni</u></p> <p>Declin functional si/sau cognitiv la persoana varstnica</p> <p><u>Nivel 3: de rutina Maxim 6 luni</u></p> <p>Individualizarea /actualizarea planurilor de ingrijire integrata a persoanelor varstnice cu polipatologii (institutionalizate sau la domiciliu)</p>	<p><i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i></p> <p><i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i></p>	
2.proceduri				

PACHET AMBULATOR

15. Hematologie

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii	<p><u>Nivel 1: Urgent maxim 7 zile</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mielom multiplu • Neutropenia • Trombocitopenie moderata • Hemofilia • Unele mielodisplazii • Unele anemii hemolitice autoimune • LLC stadiul C • Unele forme de Policitemia vera rubra <p>Unele macroglobulinemii</p> <p><u>Nivel 2: Semi-urgent maxim 1 luna</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • anemia hemolitica autoimmuna • anemia refractara • afectiuni mieloproliferative • policitemia rubra vera (PRV)/mielofibroza esentiale • Trombocitemia • Explorarea tulburarilor trombotice • LLC stadiul B <p>Explorarea diatezelor hemoragice</p> <p>Nivel 3 maxim 3 luni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trombocitopenia usoara/ stabile 	<p><i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i></p> <p><i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i></p>	<p>Pentru urmatoarele diagnostice consultatiile se vor acorda dupa cum urmeaza:</p> <p>1. Mielom multiplu: 1/luna in primul an, 1 la 3 luni in anii 2-5, 1 la 6 luni</p> <p>2. PURPURA TROMBOCITOPENICA IDIOPATICA SI CONGENITALA: lunar, ulterior trimestrial;</p>

PACHET AMBULATOR

		<ul style="list-style-type: none"> •Suspiciunea de defecte plachetare •Gamapatii monoclonale cu semnificatie incerta •LLC stadiul A •Unele imunodeficiente •Investigarea macrocitozelor •Eritrocitozele (no PVR) •Mielodisplazii usoare neevolute •Explorarea/Bilntul hemoglobinnopatiilor <p>Anemii cronice hemolitice (ereditare)</p>		
--	--	---	--	--

16. Medicină internă

Tip serviciu	Descriere	Criterii de eligibilitate	Frecventa/ Plafon	Observatii
1.consultatie	*conform capitol definitii	<p><u>Nivel 1 Urgent maxim 1 saptamana</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Agravare a conditiei la nivel de organ/sistem la pacienti cu polipatologii – pentru entitati clinice specificate la nivelul altor subspecialitati: <ul style="list-style-type: none"> - Cardiologie - Gastroenterologie - Hematologie 	<p><i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i></p> <p><i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i></p>	<p>Pentru urmatoarele diagnostice consultatiile se vor acorda dupa cum urmeaza:</p> <p>1.FIBRILATIA ATRIALA - I. 48: 1 sapt, 1 luna de la externare, ulterior trimestrial</p> <p>2. FLUTTERUL - I. 48: 1 sapt, 1 luna de la externare, ulterior</p>

PACHET AMBULATOR

		<ul style="list-style-type: none"> - Imunologie -Nefrologie - Neurologie Pneumologie - Reumatologie • Simptomatologii nespecifice/ cu cauza necunoscuta care prezinta tendinta de agravare <ul style="list-style-type: none"> - episod nou (< 3 luni) de astenie persistenta, -febra de origine necunoscuta) <u>Nivel 2: Semi-urgent</u> <u>maxim 1 luna</u> • Afectiuni acute intercurrente la pacienti cu patologii multiple cronice labile (de ex diabet, BPOC, astm) • Rezultate anormale semnificative ale testelor de laborator fara etiologie clinica clara (de ex VSH crescut in context de stare generala modificata, fara alte simptome) 		<p>trimestrial. 3.</p>
--	--	--	--	----------------------------

PACHET AMBULATOR

		<p>Nivel 3: Rutina maxim 3 luni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afectiuni cronice lent progressive • Entitati nosologice multiple la un singur pacient (ex Sindromul X) <p>Boli de sistem care necesita evaluare complexa: LED, Sarcoidoza, Hemocromatoza, etc</p>		
--	--	---	--	--

17. Nefrologie

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii	<p><u>Nivel 1 Urgent maxim 1 luna</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ¹Edeme periferice dupa excluderea ins cardiace, hepatice, ins. Venoase cronice, la pacient cu hipoalbuminemie serica si proteinurie • ²Ctrestere rapida a creatininei serice la pacient cu hematurie micro sau macroscopica 	<p><i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i></p> <p><i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i></p>	

PACHET AMBULATOR

		<p>³eFG 15 -29 ml si dispnee, anemie, HTA. Dispnee, scadere ponderala, Hparatiroidism sau HKemie</p> <p><u>Nivel 2 - semiurgent Maxim 3 luni:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• ¹eFG 15 -29 ml la pacient cu boala renala cr. stabila, cu sau fara proteinurie• ²eFG 30 -44 ml la pacient cu HTA, proteinurie, anemie, nivel crescut PTH• ³eFG 45 -59 ml si val. crescute ale creatininei in mai mult de 2 ocazii, cu sau fara alte modificari urinare, in ciuda modificarii trat. medicamentos• ⁴HTA complicata sau necontrolata , mai ales la pacienti cu debut precoce al bolii, cu istoric familial de HTA complicata, cu coafectare renala sau sistemica <p>⁵Acidoza renala prin afectare tubulara, alcaloza metabolica cu hipoKemie, H/hCaemie, H/h naemie, H/hKemie</p>		
--	--	--	--	--

PACHET AMBULATOR

		<p><u>Nivel 2: de rutina Maxim 6 luni</u></p> <ul style="list-style-type: none">• ¹Microalbuminuria la pacienti cu risc inalt• ²Afectare renala in boli ereditare• ³Oxaluria, Hparatiroidismul• ⁴Sfat privind medicatia curenta, echilibrul fluidelor etc <p><i>eFG se exprima in ml/min/1.73m² - declinul eFG cu < 4 ml/min/1.73m² indica o progresie lenta a bolii cronice renale - populatia cu risc inalt pt boala cronica renala cuprinde: V>60 ani, diabet, istoric familial de boala renala, cu boala cardiovasculara manifesta, cu HTA, fumatori</i></p>		
--	--	--	--	--

PACHET AMBULATOR

18. Neurochirurgie

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1. consultatie	*conform capitol definitii	<p><u>Nivel 1 Urgent Maxim 1 luna:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hematom subdural cronic lent progresiv • TRat chir al tumorilor intracraniene • Nevralgia severa de trigemen care nu se amelioreaza la trat uzuale • Tratament de decompresie a unui nerv periferic, in caz de deficit neurologic semnificativ sau durere severa <p><u>Nivel 2:Semiurgent Maxim 3 luni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tumori mici benigne intracraniale extrinseci de tip meningioame etc • TRat chirurgical al nevralgiei severe de trigemen • Tumori spinale cu deficit neurologic mic Sdr de entrapement al unor nervi periferici cu deficit neurologic pogresiv <p><u>Nivel 3: de Rutina Maxim 6-12 luni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Chirurgia pentru tulburari de miscare • Afectari discale degenerative, prolapsul 	<p><i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i> <i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i></p>	

PACHET AMBULATOR

		<p>cervical si lombar cu deficit neurologic minim</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stenoza de canal lombar cu afectare intermitenta a membrelor pelvine <p>Sdr de compresie usoara de nervi periferici cu deficite neurologice minimale (sdr de canal carpian, sdr de nerv ulnar, etc)</p>		
--	--	---	--	--

19. Neurologie

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1. consultatie	*conform capitol definitii	<p><u>Nivel 1 Urgent Maxim 1-2 saptamani</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Paralizia de orice cauza • Epilepsie necontrolata • Edem papilar sau afectare neurologica de focar, inclusiv afectare cognitive • Sdr de coada de cal • Vertijul fara alte simptomatologie neurologice <p>Nivel 2: 2-Semiurgent Maxim 1 luna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paralizia de orice cauza • Epilepsie necontrolata • Edem papilar sau afectare neurologica de focar, inclusiv 	<p><i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i></p> <p><i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i></p>	<p>* pentru pacientii diagnosticati cu I61 - AVC hemoragice - hemoragia intracerebrala si I63 - AVC ischemic (infarctul cerebral) consultatiile se vor acorda dupa cum urmeaza: <i>4 consultatii in primul an, ulterior 2 consultatii/an.</i></p>

PACHET AMBULATOR

		<p>afectare cognitive</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sdr de coada de cal • Vertijul fara alte simpt. neurologice <p><u>Nivel 2: Semiurgent Maxim 1 luna</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Prima criza epileptica <p>Simptome suggestive pentru scleroza multipla, neuropatie, miopatie, boala de neuron motor etc</p> <p><u>Nivel 3: de Rutina Maxim 3 luni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Demente • Sdr. Extrapiramidale • Ataxie • Tremor • Distrofii muscular si miopatii, neuropatii <p>Situatii diagnosticate anterior – migrena, cefaleea cu suspiciune de leziune intracraniana, consulturi pentru a doua opinie</p>		
--	--	--	--	--

20. Neurologie pediatrică

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
---------------------	------------------	----------------------------------	--------------------------	-------------------

PACHET AMBULATOR

1. consultatie	*conform capitol definitii	<p>Nivel 1 Urgent –in maxim 14 zile</p> <ul style="list-style-type: none"> •Instalare/agravare progresiva de semne neurologice noi/ cunoscute •Suspiciune de crestere a presiunii intracraniene •Tulburari spastice <p>Nivel 2 Rutina (1-3 luni)</p> <p>Orice tulburari motorii si musculare persistente/ repetitive (inclusiv anamnestice) la copil</p>	<p><i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i></p> <p><i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i></p>	
----------------	----------------------------	---	---	--

21. Oncologie medicală

Tip serviciu	Descriere	Criterii de eligibilitate	Frecventa/ Plafon	Observatii
1. consultatie	*conform capitol definitii	<p><u>Nivel 1 Urgent Maxim 1 luna</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Suspiciunea de cancer pulmonar, colonic, de san, limfoame, testicular etc • Pacientul cu chimio sau radioterapie care prezinta sepsis, neutropenie etc • Pacientul febril in cursul tratamentului • Complicatii severe gastrointestinal in cursul trataemntului • Chimioterapie paleativa 	<p><i>Pentru boala oncologica activa maxim 6 consultatii/an.</i></p>	

PACHET AMBULATOR

		<p>TRat chimioterapic adjuvant in unele forme de cancer</p> <p><u>Nivel 2: Semiurgent Maxim 3 luni</u></p> <p>Efecte secundare sau complicatii minore Cancerul de prostata localizat</p> <p><u>Nivel 3 de Rutina Maxim 6 luni</u></p> <p>Cancerul de prostata localizat</p>		
--	--	---	--	--

22. Obstetrică-ginecologie

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1. consultatie	*conform capitol definitii	<p><i>Nivel 1: Urgent maxim 14 zile</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangerari postmenopauza • Suspiciune impotranta de neoplazie genitla • Formatiuni pelviene cauzatoare de durere/presiune • Sangerare vaginala importanta insotita de anemie • Exacerbare a BIP 	<p><i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i></p> <p><i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i></p>	

PACHET AMBULATOR

		<p>Prolaps uterin grd IV ulcerat</p> <p>Nivel 2: semiurgenta Maxim 1 luna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Test BPN HSIL CINII sau III • Chiste ovariene complexe > 50 ani • Prolaps grd IV neulcerat • Menoragia cu sau fara fibrom <p>Scurgeri persistente , coprpi straini, formatiuni palpabile</p> <p>Nivel 3: de rutina Maxim 3 luni</p>		
--	--	---	--	--

23. Oftalmologie

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1. consultatie	*conform capitol definitii	<p>Nivel 1: Urgent Max 2 saptamani</p> <ul style="list-style-type: none"> • Detasarea de retina/hemoragia retiniana • Hemoragia de vitros • Maculopatie legata de varsta • Paralizii de NC, Glaucomul, Edemul discului 	<p><i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i></p> <p><i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i></p>	

PACHET AMBULATOR

		<ul style="list-style-type: none">• Retinopatie• Afectiuni maligne inrtaoculare• Dacriocistita acuta <p><i>Nivel 2: Semiurgent Maxim 1 luna</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Strabism, tulburari de refractie la copii• Tumori benigne si cancere neprogresive• Maculopatie, hemoragia de vitros• Entropion, ectropion sever• Dacriocistita cronica• Proptozis, afectare ocular in Basedow• Cefalee cu simptome oculare <p><u>Nivel 3 - de rutina Maxim 3 luni</u></p> <p>Pterigyum</p> <ul style="list-style-type: none">• Ectropion• Epifora• Monitorizarea de rutina – Ex FO		
--	--	--	--	--

PACHET AMBULATOR

		<ul style="list-style-type: none"> • Miopia severa, hipermetropia 	
--	--	--	--

24. Otorinolaringologie

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1. consultatie	*conform capitol definitii	<p><u>Nivel 1: Urgent</u> <u>maxim 2 saptamani</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Surditatea subita • Vertijul sever periferic • Pareza faciala acut instalata (cu suspiciune de cauza otologica) • Apneea de somn (documentata) • Limfadenopatia cervicala ne-explicabila • Ulceratiile orofaringiene • Fractura nazala necomplicata • Disfagia faringiana • Infectii acute persistente/ agravate sub tratament 	<p><i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i></p> <p><i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i></p>	

PACHET AMBULATOR

		<p>Angina insotita de simptome sugestive pentru MNI</p> <p><u>Nivel 2: Semi-urgent</u> <u>maxim 1 luna</u></p> <ul style="list-style-type: none">•Obstructia nazala progresiva unilaterala•Tinitus pulsatil cu aspect timpanic normal•Epistaxis minor recurrent•Durerea faringiana persistenta•Disfonia persistenta/progresiva fara cauza aparenta•Hipoacuzia progresiva asimetrica•Epistaxis recurent in absenta problemelor de coagulare•Otalgie severa persistenta de cauza inaparenta•Durere faciala atipica severa/persistenta/ fara cauza aparenta•Inflamatie parotidiana persistenta		
--	--	--	--	--

PACHET AMBULATOR

		<ul style="list-style-type: none">•Formatiuni cervicale cu caracter inflamator persistent Formatiuni cervicale nedureroase persistente (> 3 saptamani) <u>Nivel 3: Rutina maxim</u> <u>3 luni</u> <ul style="list-style-type: none">•Vertij episodic /persistent/•Otita medie secretoare recurenta/ simptome persistente•progresiv (insotit de hipoacuzie)•Tinitus uni/bilateral asociat cu hipoacuzie/vertij/otoree•Amigdalite recurente (> 6 episoade documentate in ultimele 12 luni sau 3 episoade/an ultimii 3 ani)•Hipoacuzia progresiva simetrica•Rinita cu simptome necontrolate care afecteaza calitatea vietii•Obstructia nazala persistenta fara cauza		
--	--	---	--	--

PACHET AMBULATOR

		aparenta Sforaitul invalidant (cu probabilitate inalta de apnee de somn)		
--	--	---	--	--

25. Ortopedie și traumatologie

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1. consultatie	*conform capitol definitii	<p><u>Nivel 1 Urgent 2 saptamani:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tumori maligne primare sau metastatice • Tumori benigne • Fracturi care necesita monitorizare • Leziuni de tendon prezentate tardiv <p><u>Nivel 2 semiurgent maxim 3 luni</u></p> • Proteze mobile, in lipsa de infectie la sold, genunchi • Sdr de coafa a rotatorilor • Sdr de entrapement ale unor nervi 	<p><i>Pentru boala acuta: 4 consultatii standard B2, si 5 consultatii de tip A</i></p> <p><i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i></p>	

PACHET AMBULATOR

		<ul style="list-style-type: none"> • Tendinopatii Implanturile metalice devenite simptomatice <p><u>Nivel de rutina Maxim 2-6 luni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Boala artrozica • Dupuytren • Cervicalgia si lombalgia cronica • Instabilitatea articulara cronica • Entezopatiile • Afectiuni ale piciorului <p>Genu valgus/varus</p>		
--	--	---	--	--

26. Ortopedie pediatrică

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1. consultatie	*conform capitol definitii		<i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i> <i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i>	

27. Pediatrie

PACHET AMBULATOR

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii	<p>Nivel 1 – Urgent Maxim 7 zile</p> <ul style="list-style-type: none"> •Orice episod nou de boala insotit de modificarea semnificativa si persistenta a starii generale (voma, deshidratare, scadere ponderala, cefalee, semne neurologice persistente) •Deteriorarea neasteptata a unei afectiuni cunoscute •Anemia feripriva nou aparuta •Diareea persistenta •Disfagia +/- obstructie <p>Nivel 2 – semiurgent Maxim 2 luni</p> <ul style="list-style-type: none"> •ITU recurente •proteinuria si/sau hematuria persistenta •Incetinirea cresterii si dezvoltarii •Astmul bronic cu control insuficient <ul style="list-style-type: none"> • Diareea cronica • Durerea abdominala persistente/recurenta • Tuse, cefalee, febra, dureri musculo-scheletale sau orice alte simptome nou aparute care sunt persistente (> 2 saptamani) si inexplicabile • Tulburari la adolescent : <ul style="list-style-type: none"> - sindrom de oboseala cronica, - scaderea performantei scolare, 	<p><i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i></p> <p><i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i></p>	

PACHET AMBULATOR

		<p>-tulburari de somatizare</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suspiciunea de malabsorbtie • Refluxul gastro-esofagian • Boala Celiaca simptomatice <p>Nivel 3 – de rutina (3-6 luni)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obezitatea • Tulburari de crestere si dezvoltare (inclusiv sexuala) • Simptome cronice • Tulburari de tranzit/encopresis • Boala Celiaca asimptomatice • Alte afectiuni cronice cunoscute 		
--	--	---	--	--

28. Pneumologie

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
---------------------	------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------

PACHET AMBULATOR

<p>1.consultatie</p>	<p>*conform capitol definitii</p>	<p><u>Nivel 1 urgent Maxim 1-2 saptamani</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuberculoza pulmonara • Infectii severe la pacienti cu alte comorbiditati sau imunodeprimati <p>Fibroza chistica</p> <ul style="list-style-type: none"> • AB cu stare agravata lent • BPOC complicat sever • Suspiciune de cancer pulmonar – hemoptizie recenta semnificativa, sdr de obstructive a VCS • Sdr de hipertensiune pulmonara • Fibroze pulmonare <p><u>Nivel 2: Semiurgent Maxim 1 luna</u></p> <p>Afectiunile anterioare dar cu severitate mai mica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dispneea de etiologie incerta - • Afectarea respiratorie asociata cu alte comorbiditati • Suspiciunea de sarcoidoza • Sdr. de apnee de somn sever • Sdr restrictive la pacienti cu disfunctie musculara, toracica, revarsat pleural important etc <p>Nodulul pulmonar</p> <p><u>Nivel 3: de Rutina Maxim 3 luni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sdr. de apnee de somn • BPOC sever • Astmul necontrolat /partial controlat in trepte terapeutice IV-V 	<p><i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i></p> <p><i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i></p>	
-----------------------------	-----------------------------------	--	---	--

PACHET AMBULATOR

		<ul style="list-style-type: none"> • Sdr. de tuse cronica • Contactii TB Bronsiectaziile		
--	--	--	--	--

29. Psihiatrie

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii		<i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i> <i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i>	*in cazul pacientilor aflati in tratament cu medicamente in care medicul specialist psihiatru este unic prescriptor, nr. maxim de consultatii permis este in concordanta cu prevederile protocoalelor de prescriere.

30. Psihiatrie pediatrică

PACHET AMBULATOR

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii		<i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control) Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i>	

31. Reabilitare medicală*

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii		<i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control) Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i>	Pentru urmatoarele diagnostice consultatiile se vor acorda dupa cum urmeaza: 1.Infart: 2. ACV

*conform prevederilor ANEXEI - **Pachetul de servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinică reabilitare medicală**

32. Reumatologie

PACHET AMBULATOR

Tip serviciu	Descriere	Criterii de eligibilitate	Frecventa/ Plafon	Observatii
1.consultatie	*conform capitol definitii	<p>Nivel 1 Urgent Maxim 1-2 saptamani:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arterita cu celule gigante • LES • PAR in puseu • POli/ Dermatomiozita • Artite septice • Guta cu afectare poliarticulara <p>Nivel 2 Semiurgent Maxim 1-2 luni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boli sistemice ale țesutului conjunctiv (LES, Artita psoriazică, PAR, Sclerodermia, Sindrom Sjogren, etc) • Boala Paget a osului severă • Osteoporoza severa si simptomatice • Osteomalacia <ul style="list-style-type: none"> • Suspiciune de boala sistemica • Suspiciune de sdr. paraneoplazic <ul style="list-style-type: none"> • Pacienti cu comorbidități care sporesc nivelul de dependență • Pacienți având în grijă un partener dependent • Pacienți care nu mai pot continua activitatea în câmpul muncii <p>Nivel 3 de Rutina Maxim 3 luni</p> <p>Artroze</p>	<p><i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i></p> <p><i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i></p>	

PACHET AMBULATOR

		<p>Reumatism abarticular (Epicondilita, sindrom de canal carpian, fasciita plantară etc)</p> <p>Sindrom cu durere cronică: Fibromialgia, Durerea lombară joasă cronică</p>		
--	--	--	--	--

33. Urologie

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii	<p><u>Nivel 1: 1 Urgent Maxim 1 Luna</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Suspiciunea de leziune maligna: hematuria macroscopic la adulti, hematuria microscopica la adultii peste 50 de ani, • suspiciunea de cancer testicular (tumefiere testiculara), • suspiciunea de cancer penian, • suspiciunea de cancer renal (mase tumorale solide la ex radiologic), • suspiciunea de cancer prostatic (PSA > la barbati cu speranta de viata de peste 10 ani etc) • suspiciunea de cancer al vezicii urinare la persoane la risc 	<p><i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i></p> <p><i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i></p>	

PACHET AMBULATOR

		<ul style="list-style-type: none"> • Obstructia renala Hematuria macroscopic nedureroasa <p><u>Nivel 2: Semiurgent Maxim 3 luna</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Afectiuni cu durere care cedeaza la trat uzuale • Afectiuni ce conduc la restrictionarea activitatii socio-economice • Vezica neurogena <p><u>Nivel 3: de rutina maxim 6 luni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Modificari ale scrotului (varicocel, chist epididimar, hidrocel etc) • Incontinenta urinara de effort sau mictiunile imperioase la femei • Tulburari mictionale de tip obstructive la barbat– adenomul prostatic Infectii urinare recurente 		
--	--	--	--	--

34. Chirurgie vasculară

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii		<i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie</i>	

PACHET AMBULATOR

			<i>initiala, 1 consultatie de control)</i> <i>Pentru boala cronica: maxim 4 consultatii/an</i>	
--	--	--	---	--

35. Radioterapia*)

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1. consultatie	*conform capitol definitii			
2. proceduri				

**se va realiza conform capitolului Imagistica*

36. Chirurgie orală și maxilo-facială**)

<i>Tip serviciu</i>	<i>Descriere</i>	<i>Criterii de eligibilitate</i>	<i>Frecventa/ Plafon</i>	<i>Observatii</i>
1.consultatie	*conform capitol definitii		<i>Pentru boala acuta: 2 consultatii (1 consultatie initiala, 1 consultatie de control)</i> <i>Pentru boala cronica: maxim 4</i>	

PACHET AMBULATOR

			<i>consultatii/an</i>	
--	--	--	-----------------------	--

*** se va realiza conform anexei servicii dentare

B. PROCEDURI DIAGNOSTICE SI TERAPEUTICE/EXPLORARI FUNCTIONALE

- C00701 INDEPARTAREA CORPILOR STRAINI SUPERFICIALI DE PE CORNEE
- C00702 INDEPARTAREA CORPILOR STRAINI INCLAVATI IN CORNEE CU MAGNET
- C01301 DEBRIDAREA EPITELIALA A CORNEEI
- C01302 EXCIZIA PTERIGION-ULUI
- C02001 COAGULAREA CU LASER A VASELOR SANGUINE SCLERALE
- C02201 EXCIZIA PINGUECULEI
- C07202 SECTIONAREA BLEFARORAFIEI
- C07401 EXCIZIA CHISTULUI TARSAL
- C08502 INCIZIA SACULUI LACRIMAL
- C09201 INDEPARTAREA CORPILOR STRAINI SUPERFICIALI DE PE CONJUNCTIVA
- C09202 INJECTIA SUBCONJUNCTIVALA
- C09302 INDEPARTAREA CORPILOR STRAINI INCLAVATI DE PE CONJUNCTIVA
- G02401 BRONHOSCOPIA
- G02403 FIBROBRONHOSCOPIA
- G02503 FIBROBRONHOSCOPIA CU BIOPSIE
- G03101 BIOPSIA PERCUTANATA (CU AC) A PLEUREI
- J00101 ESOFAGOSCOPIA FLEXIBILA

PACHET AMBULATOR

J01202 ESOFAGOSCOPIA CU BIOPSIE
J05401 SIGMOIDOSCOPIA RIGIDA
J05502 COLONOSCOPIA FLEXIBILA PANA LA CEC
J06103 COLONOSCOPIA FLEXIBILA PANA LA CEC, CU BIOPSIE
J13901 ENDOSCOPIA PANA LA DUODEN
J14201 ENDOSCOPIA PANA LA DUODEN CU BIOPSIE
J14202 ENDOSCOPIA ILEALA CU BIOPSIE
K04901 CISTOSCOPIA
K05205 ASPIRATIA PERCUTANATA (CU AC) A VEZICII URINARE
K07201 URETROSCOPIA
K08201 DILATAREA URETRALA CU BUJII
K08202 DILATAREA STRICTURILOR URETRALE
L01603 SUTURA LACERATIILOR SCROTULUI SAU ALE TUNICII VAGINALE
M03601 DISTRUCTIE CU LASER DE LEZIUNE A COLULUI UTERIN
M03602 CAUTERIZARE DE COL UTERIN
M03604 DIATERMOCOAGULAREA COLULUI UTERIN
M03701 BIOPSIA DE COL UTERIN
M03702 POLIPECTOMIA LA NIVELUL COLULUI UTERIN
M03706 CONIZATIA DE COL UTERIN PRIN LASER
M04001 VAGINOSCOPIA
M04002 COLPOSCOPIA
M04201 DISTRUCTIA DE PAPILOM VAGINAL
M04302 BIOPSIA DE VAGIN
M05001 DISTRUCTIA DE PAPILOM VULVAR
M05101 TRATAMENTUL ABCESULUI GLANDEI BARTHOLIN
N00101 AMNIOCENTEZA DIAGNOSTICA
N00102 BIOPSIE DE VILI CORIONICI
O03801 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE CLAVICULA
O03901 REDUCEREA INCHISA A LUXATIEI DE CLAVICULA
O03903 REDUCEREA INCHISA A LUXATIEI DE UMAR
O04401 IMOBILIZAREA FRACTURII DE HUMERUS PROXIMAL
O04402 IMOBILIZAREA FRACTURII DE DIAFIZA HUMERALA

PACHET AMBULATOR

O04403 IMOBILIZAREA FRACTURII DE HUMERUS DISTAL
O04901 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE HUMERUS PROXIMAL
O04903 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE DIAFIZA HUMERALA
O04905 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE HUMERUS DISTAL
O05101 REDUCEREA INCHISA A LUXATIEI DE COT
O05103 REDUCEREA INCHISA A LUXATIEI DE ARTICULATIE RADIO-ULNARA PROXIMALA
O05601 IMOBILIZAREA FRACTURII DE EPIFIZA DISTALA DE RADIUS
O05602 IMOBILIZAREA FRACTURII ULNARE DISTALE
O05603 IMOBILIZAREA FRACTURII DE DIAFIZA DE RADIUS
O05604 IMOBILIZAREA FRACTURII DE DIAFIZA ULNARA
O05605 IMOBILIZAREA FRACTURII DE DIAFIZA DE RADIUS SI ULNARA
O06101 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE EPIFIZA DISTALA DE RADIUS
O06103 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE DIAFIZA DE RADIUS
O06105 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE DIAFIZA DE RADIUS CU LUXATIE
O06107 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE CAP SAU COLET AL RADIUSULUI
O06201 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE EPIFIZA DISTALA ULNARA
O06203 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE DIAFIZA ULNARA
O06205 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE DIAFIZA ULNARA CU LUXATIE
O06207 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE OLECRAN
O06701 REDUCEREA INCHISA A LUXATIEI DE ARTICULATIE RADIO-ULNARA DISTALA
O10805 IMOBILIZAREA LUXATIEI DE SOLD
O11805 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE FEMUR
O11901 REDUCEREA INCHISA A LUXATIEI DE SOLD
O12601 IMOBILIZAREA FRACTURII DE PLATOU TIBIAL MEDIAL SAU LATERAL
O12602 IMOBILIZAREA FRACTURII DE PLATOU TIBIAL MEDIAL SI LATERAL
O12603 IMOBILIZAREA GIPSATA A FRACTURII DIAFIZARE DE TIBIE
O12604 IMOBILIZAREA FRACTURII DE PERONEU
O12605 IMOBILIZAREA FRACTURII DE ROTULA
O13701 REDUCEREA INCHISA A LUXATIEI DE GENUNCHI
O13702 REDUCEREA INCHISA A LUXATIEI DE ROTULA
O13801 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE PLATOU TIBIAL MEDIAL SAU LATERAL
O13803 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE PLATOU TIBIAL MEDIAL SI LATERAL

PACHET AMBULATOR

O14001 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE DIAFIZA TIBIALA
O14002 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE DIAFIZA TIBIALA CU FIXARE INTERNA
O14004 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII INTRA-ARTICULARE DE DIAFIZA TIBIALA
O15602 IMOBILIZAREA FRACTURII DE CALCANEU
O15603 IMOBILIZAREA LUXATIEI DE CALCANEU
O15604 IMOBILIZAREA FRACTURII DE ASTRAGAL
O15605 IMOBILIZAREA LUXATIEI DE ASTRAGAL
O15606 IMOBILIZAREA FRACTURII DE TARS
O15607 IMOBILIZAREA FRACTURII DE METATARS
O15608 IMOBILIZAREA TENDONULUI ACHILLIAN
O16501 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE CALCANEU
O16503 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE ASTRAGAL
O16505 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII INTRA-ARTICULARE DE CALCANEU
O16507 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII INTRA-ARTICULARE DE ASTRAGAL
O16509 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE ARTICULATIE TARSOMETATARSIANA
O16511 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE METATARS
O16601 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE GLEZNA
O16604 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE FALANGA A HALUCELUI
O16606 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE FALANGA A DEGETULUI PICIORULUI, ALTUL DECAT HALUCELE
O16901 REDUCEREA INCHISA A LUXATIEI DE GLEZNA
O16903 REDUCEREA INCHISA A LUXATIEI DE DEGET AL PICIORULUI
O16905 REDUCEREA INCHISA A LUXATIEI DE ASTRAGAL
O16907 REDUCEREA INCHISA A LUXATIEI DE CALCANEU
O16909 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE CALCANEU CU LUXATIE
O16911 REDUCEREA INCHISA A FRACTURII DE ASTRAGAL CU LUXATIE
O17501 CORECTIA PICIORULUI EQUINOVARUS, UNILATERAL
O17504 CORECTIA PICIORULUI EQUINOVARUS, BILATERAL
O17903 INJECTAREA IN LIGAMENT, TENDON SAU PARTI MOI
P01001 TERAPIA CU PSORALENI SI ULTRAVIOLETE A (PUVA) A ALTOR ZONE
P01002 TERAPIA CU PSORALENI SI ULTRAVIOLETE A (PUVA) A MAINII
P01003 TERAPIA CU PSORALENI SI ULTRAVIOLETE A (PUVA) A PICIORULUI
P01004 TERAPIA CU PSORALENI SI ULTRAVIOLETE A (PUVA) A MAINII SI PICIORULUI

PACHET AMBULATOR

P01101 TERAPIA CU ULTRAVIOLETE B IN ALTE ZONE
P01303 CHIURETAJUL LEZIUNILOR TEGUMENTARE, LEZIUNE UNICA
P01304 CHIURETAJUL LEZIUNILOR TEGUMENTARE, LEZIUNI MULTIPLE
P01309 ELECTROTERAPIA LEZIUNILOR TEGUMENTARE, LEZIUNE UNICA
P01310 ELECTROTERAPIA LEZIUNILOR TEGUMENTARE, LEZIUNI MULTIPLE
P01701 BIOPSIA TEGUMENTULUI SI TESUTULUI SUBCUTANAT
P01803 INDEPARTAREA MOLUSCUM-ULUI CONTAGIOSUM
S02602 MASURAREA TONUSULUI MUSCHILOR RESPIRATORI LA DIVERSE VOLUME PULMONARE
S02603 MASURAREA REZISTENTEI SAU FATIGABILITATII MUSCHILOR RESPIRATORI
S02701 TESTUL DE EFORT PENTRU EVALUAREA FUNCTIEI RESPIRATORII
S02702 SPIROMETRIE DE EFFORT
S02806 MASURAREA SCHIMBULUI DE GAZE
S02807 MASURAREA CAPACITATII DE DIFUZIE A MONOXIDULUI DE CARBON
S02808 MASURARE VOLUMULUI PULMONAR TOTAL
S02809 MASURAREA REZISTENTEI CAILOR AERIENE SAU PULMONARE
S02813 TESTE DE PROVOCARE INHALATORII
S02904 MONITORIZAREA PRESIUNII ARTERIALE SISTEMICE
S03202 INREGISTRARE ECG CONTINUA AMBULATORIE, HOLTER
S03401 ALT TIP DE ELECTROCARDIOGRAFIE [ECG]
S03404 INREGISTRAREA ECG A SEMNALULUI MEDIAT
S03502 TESTAREA PACEMAKER-ULUI IMPLANTAT SECVENTIAL ATRIOVENTRICULAR [AV]
S03503 TESTAREA PACEMAKER-ULUI IMPLANTAT CU RASPUNS LEGAT DE FRECVENTA CARDIACA
S03504 TESTAREA PACEMAKER-ULUI IMPLANTAT ANTITAHIARITMIE
S03602 TESTUL DE EFORT CARDIOVASCULAR
S03604 TESTUL DE INCLINATIE (PENTRU SINCOPA VASO-VAGALA)
S04101 DEBITMETRIA URINARA
S07904 INSERTIA ALTUI PESAR VAGINAL
S07911 INDEPARTAREA ALTUI PESAR VAGINAL
S07913 INDEPARTAREA ALTOR DISPOZITIVE DIN TRACTUL GENITAL

PACHET AMBULATOR

C. INVESTIGATII PARACLINICE AMBULATORII

1	Hemoleucograma completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, numărătoare reticulocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari inclusiv VSH
2	Examen citologic al frotiului sangvin
3	Determinare ABO + Rh la gravida
4	Determinare Izo Rh (Anti Rh) la gravida
5	Oricare dintre: Timp Quick, protrombina (inclusiv INR) sau APTT sau Timp trombina sau fibrinogen sau orice produs degradare fibrinogen sau D-dimeri
6	2 teste din cele de mai sus
7	3 teste
8	4 sau mai multe teste
9	Oricare din: uree serica sau urinara, acid uric seric sau urinar, creatinina serica sau urinara, calciu seric total, magneziemie, glicemie, glucoza urinara, colesterol seric total, trigliceride serice, proteine totale serice sau urinare, bilirubina sau alta fractiune a acesteia, proteina C reactiva, gamma GT, TGO, TGP, sodiu, potasiu, albumina
10	2 teste din cele de mai sus
11	3 teste
12	4 teste
13	5 sau mai multe teste

PACHET AMBULATOR

14	HDL colesterol
15	LDL colesterol
16	Calciu ionic seric
17	Sideremie
18	Electroforeza proteinelor serice
19	Fosfatază alcalină
20	LDH
21	Creatinkinaza (CK)
24	Hemoglobina glicată
25	Cetonurie
26	Clearence creatinina
27	Microalbuminurie
28	Rata filtrării glomerulare
29	Osmolaritate serica
30	Osmolaritate urinara
31	Determinarea cantitativa a oricare din: Alpha-fetoproteina, Antigen CA-15.3 (CA15.3), Antigen CA-125 (CA125), Antigen CA-19.9 (CA19.9), Tiroglobulina serica, PSA, free-PSA
32	2 sau mai multe teste

PACHET AMBULATOR

33	Dozare sange sau urina a oricare dintre: TSH, FT4, aldosteron, cortizol, FSH, hormon de crestere, LH, estradiol, estrogen, progesteron, prolactina, PTH, renina, somatomedina C (IGF-1), testosteron
34	2 teste din cele de mai sus
35	3 teste
36	4 teste
37	
38	Examen microscopic si cultura din oricare: urina, sputa, secretii vaginala, uretrala, faringe, otice, nazale, conjunctivale, puroi
39	Antibiograma
40	Examen Babeş-Papanicolau*1)
41	Examen coproparazitologic (3 probe)*1)
42	Coprocultură*1)
43	Examen complet de urină (sumar + sediment)*1)
44	ASLO*1)
45	Testare HIV la gravidă*1)
46	Anti HCV*2)
47	Ag HBs (screening)*2)
48	Anti-HAV IgM*2)
49	Oricare dintre: IgA, IgG, IgM, IgD, IgE seric

PACHET AMBULATOR

50	2 teste din cele de mai sus
51	3 sau mai multe teste
52	Complement seric C3 si C4
53	Factor reumatoid
54	VDRL*1)
55	RPR*1)
56	Confirmare TPHA*1), *4)
57	Depistare Helicobacter Pylori
58	Anticorpi anticardiolipinici IgG, IgM
59	Anticorpi antinucleari (ANA) -screening
60	Anticorpi anti-LKM1
61	Anticorpi anti -peptidul citrulinat ciclic (Anticorpi anti-CCP)
62	Ag HBe
63	Anti- Hbe
64	Anti-HBc
65	Test de toleranta orala la glucoza
66	Examen lichid puncție
67	Examen microscopic/frotiu

PACHET AMBULATOR

68	Cultură
69	Antibiograma
70	Examen microscopic si cultura din oricare: urina, sputa, secretie vaginala, secretie uretrala, otica, nazala, conjunctivala, puroi
71	Examinări histopatologice
72	Biopsii/piese chirurgicale - procesare si diagnostic histopatologic (coloratie H&E)
73	- 1-3 blocuri de parafina
74	- 4-10 blocuri de parafina
75	- 11-20 blocuri de parafina
76	- >20 blocuri de parafina
77	Examen histopatologic cu colorații speciale
78	Teste imunohistochimice (IHC)
79	Examen citopatologic
80	- examen Babes-Papanicolau din secretie vaginala
81	- examen citopatologic din lichide biologice
82	Test HER2 CISH pentru cancerul de san

PACHET AMBULATOR

D. IMAGISTICA MEDICALA

Problema clinica	Investigatie (doza)	Nivel de recomandare
A. Craniul (inclusiv problemele ORL)		
Tulburari congenitale <i>(Pentru copii vezi sectiunea M)</i> A1	RMN (0)	Indicat (C)
Accident vascular cerebral (AVC) A2	CT (II) RMN (0) si Echo carotidian (0)	Indicat (C) Investigatie specializata (B) Nu e indicat de rutina (C)
Atac ischemic tranzitor (AIT) <i>(vezi si B5)</i> A3	Echo carotidian (0)	Indicat (B)
Demielinizarea si alte boli ale substantei albe A4	RMN (0)	Indicat (A)
Leziune cerebrala inlocuitoare de spatiu (SOL) A5	CT (II) sau RMN (0)	Indicat (B)
Cefalee: acuta, severa	CT (II)	Indicat (B)

PACHET AMBULATOR

	A6	RMN (0)	Investigatie specializata (C)
Cefalee cronica <i>(Pentru copii vezi sectiunea M)</i>	A7	RX craniu, sinus, coloana cervicala (I) CT (II) sau RMN (0)	Nu e indicat de rutina (B) Nu e indicat de rutina (B)
Probleme hipofizare si paraselare	A8	RMN (0)	Investigatie specializata (B)
		Rx craniu(I)	Nu e indicat de rutina (C)
Simptome de fosa cerebrala posterioara A9		RMN (0)	Indicat (A)
Hidrocefalie <i>(pentru copii vezi Sectiunea M)</i>	A10	CT (II)	Indicat (B)
		Rx	Indicat (C)
Simptome ureche medie sau interna (inclusiv vertijul) A11		CT (II)	Investigatie specializata (B)
Surditate neurosenzoriala <i>(pentru copii vezi Sectiunea M)</i>	A12	RMN (0)	Investigatie specializata (B)
Sinuzita <i>(pentru copii vezi Sectiunea M)</i>	A13	Rx sinusuri (I) CT (II)	Nu e indicat de rutina (B) Investigatie specializata (B)
Dementa si tulburari de memorie, psihoza la debut	A14	Rx craniu(I) CT (II) sau RMN (0)	Nu e indicat de rutina (B) Investigatie specializata (B)
Leziuni orbitale	A15	CT (II) sau RMN (0)	Investigatie specializata (B)
Orbita - Corp strain metalic (inaintea RMN)		Rx orbita (I)	Indicat (B)

PACHET AMBULATOR

A16		
Tulburari vizuale A17	Rx craniu (I)	Nu e indicat de rutina (C)
Epilepsie (adult) <i>(pentru copii vezi Sectiunea M)</i>	Rx craniu (I)	Nu e indicat de rutina (B)
A18	CT (II), RMN (0)	Investigatie specializata (B)
B. Gâtul (pentru coloana vertebrala), vezi Sectiunile C – Coloana si K - Trauma		
Tesuturi moi		
Noduli tiroidieni si hipertiroidism B1	Echografie tiroidiana (0) si Medicina nucleara (I)	Indicat (B)
Tirotoxicoza B2	Echografie tiroidiana (0) si Medicina nucleara (I)	Indicat (B)
Tesut tiroidian ectopic (ex. tiroida linguala) B3	Medicina nucleara (I)	Indicat (C)
Suflu carotidian asimptomatic B4	Echo carotidian (0)	Nu e indicat de rutina (B)
Masa tumorală de origine necunoscută B5	Echografie (0)	Indicat (C)
Obstructie salivara B6	Echografie (0) sau Sialografia (II)	Indicat (C)
	Rx	Nu e indicat de rutina (C)
Masa tumorală la nivelul glandelor salivare B7	Echografie (0)	Indicat (B)
Disfunctia articulatiei temporomandibulare B8	Rx (I)	Investigatie specializata (B)
	RMN (0)	Investigatie specializata (B)
C. Coloana vertebrala		

PACHET AMBULATOR

Partea generala (pentru traume, vezi Sectiunea K)		
Boli congenitale	Rx (I)	Investigatie specializata (C)
(pentru copii vezi Sectiunea M) C1	RMN (0)	Investigatie specializata (B)
Mielopatie: tumori, inflamatie, infectie C2	RMN (0)	Indicat (B)
Coloana cervicala		
Subluxatia atlanto-axiala C3	Rx (I)	Indicat (C)
Cervicalgie, brahialgie, modificare degenerativa C4	Rx (I)	Nu e indicat de rutina (B)
	RMN (I)	Investigatie specializata (B)
Coloana toracica		
Durere fara trauma: boala degenerativa C5	Rx (I)	Nu e indicat de rutina (B)
	RMN (0)	Investigatie specializata (B)
Coloana lombara		
Durere lombara cronica fara semne de infectie sau tumora (lombalgie) C6	Rx (II)	Nu e indicat de rutina (C)
	RMN (0) sau CT (II)	Investigatie specializata (C)
Lombalgie cu posibile caracteristici severe ca: <ul style="list-style-type: none"> • debut la <20 ani, >55 ani • tulburari sfincteriene sau de mers • sindromul cozii de cal • deficit senzitiv muscular 	Imagistica	Indicat (B)

PACHET AMBULATOR

<ul style="list-style-type: none"> • pierdere motorie severa sau progresiva • deficit neurologic extins • carcinom in antecedente • HIV • scadere in greutate • corticoterapie, steroizi • diformitate structurala • durere non-mecanica <p style="text-align: right;">C7</p>		
Lombalgie acuta: hernierea discului; sciatica fara complicatii	Rx (II)	Nu e indicat de rutina (C)
	RMN (0) sau CT (II)	Nu se indica initial (B)
C8		
D. SISTEMUL LOCOMOTOR		
Osteomielita	Rx (I) sau RMN (0)	Indicat (B)
	CT(II)	Investigatie specializata (C)
D1		
Tumora osoasa primitiva	RX (I)	Indicat (B)
	RMN (0) sau CT (II)	Investigatie specializata (B)
D2		
Tumora primara cunoscuta. Metastaze osoase	Scintigrafie osoasa	Indicat (B)
	RMN (0)	Investigatie specializata (C)
D3		
Masa tumorală de parti moi	RMN (0)	Indicat (B)
D4		
Durere osoasa	Rx (I)	Indicat (B)
	RMN (0) sau Scintigrafie osoasa	Investigatie specializata (B)
D5		
Mielom	Scintigrafie osoasa (II)	Nu e indicat de rutina (B)
	RMN (0)	Investigatie specializata (B)
D6		

PACHET AMBULATOR

Osteomalacia D7	RX (0)	Indicat (B)
Durere – colaps osteoporotic D8	RX (II) toracic lateral si coloana lombar	Indicat (B)
Artropatie D9	RX (I) articulatie afectata	Indicat (C)
	RX (I) maini/picioare	Indicat (C)
	RX (II) multiarticular	Nu e indicat de rutina (C)
	Echografie (0) sau RMN (0)	Investigatii specializate (B)
Artropatie, urmarire boala D10	Rx (I)	Nu e indicat de rutina (C)
Articulatia umarului dureroasa (umarul dureros) D11	Rx (I)	Nu e indicat initial (C)
Sindrom algic post-protezare D12	Rx (I) Echografie (0)	Indicat (B) Investigatie specializata (B)
Sindromul de impingement al umarului D13	RMN (0)	Investigatie specializata (B)
	Echografie articulatie umar (0)	Investigatie specializata (B)
Umar instabil D14	CT (II)	Investigatie specializata (B)
	RMN (0)	Investigatie specializata (C)
Leziuni ale muschilor rotatori D15	Echografie (0) sau RMN (0)	Investigatie specializata (B)
Leziunea articulatiei sacroiliace (SI) D16	Rx articulatii sacroiliace (II)	Indicat (B)
	RMN (0) sau CT (II)	Investigatie specializata (C)
Dureri de sold: miscare completa	Rx pelvis (I)	Nu e indicat de rutina (C)

PACHET AMBULATOR

<i>(pentru copii, vezi Sectiunea M)</i> D17		
Dureri de sold: miscari limitate <i>(pentru copii, vezi Sectiunea M)</i> D18	Rx pelvis (I)	Nu e indicat initial (C)
Durere coxofemurala: necroza aseptica D19	Rx pelvis (I)	Indicat (B)
	RMN (0)	Investigatie specializata (B)
Durere de genunchi: fara blocaj sau limitare a miscarii D20	Rx (I)	Nu e indicat de rutina (C)
Durere de genunchi: cu blocaje, limitarea miscarii sau efuziune (pierdere articulara) D21	Rx (I)	Indicat (C)
Durere de genunchi: anterior efectuării artroscopiei D22	RMN (0)	Investigatie specializata (B)
Monturi (haluce valg) D23	Rx (I)	Investigatie specializata (C)
Fasceita plantara – „pinteni” calcaneeni (talalgia) D24	Rx (I)	Nu e indicat de rutina (B)
E. Sistemul cardiovascular		
<i>Sindrom coronarian acut: disectie aortica</i> E1	<i>Rx torace (I)</i>	<i>Indicat (B)</i>
	<i>CT (III) sau Echo (0) sau RMN (0)</i>	<i>Indicat (B)</i>
Sindrom coronarian cronic: disectie de aortica E2	RMN (0)	Investigatie specializata (B)
Embolie pulmonara E3	Scintigrafie pulmonara (II) sau CT (III)	Indicat (B)

PACHET AMBULATOR

Pericardita – efuziunea pericardica E4	Rx toracic (I)	Indicat (B)
	Echografie (0)	Indicat (B)
Suspiciune de valvulopatie E5	Rx thoracic (I) si Echo cardiac (0)	Indicat (B)
Deteriorare clinica dupa infarct miocardic E6	Echo cardiac (0)	Indicat (B)
Urmarirea pacientilor cu cardiopatie sau hipertensiune E7	Rx toracic (I)	Nu e indicat de rutina (B)
Anevrism de aorta abdominala E8	Echografie aorta (0)	Indicat (A)
	CT (III) sau RMN (0)	Indicat (A)
Tromboza venoasa profunda E9	Echografie vene membre inferioare (0)	Indicat (A)
Ischemie membre inferioare E9	Angiografie (III)	Investigatie specializata (A)
F. Sistemul toracic		
Durere toracica nespecifica F1	Rx toracic (I)	Nu este indicat initial (C)
<i>Traumatism toracic</i> F2	<i>Rx toracic (I)</i>	<i>Nu este indicat de rutina (C)</i>
Infectie de tract respirator superior F3	Rx toracic (I)	Nu este indicat de rutina (C)
Boala respiratorie obstructiva cronica sau astm; monitorizare F4	Rx toracic (I)	Nu este indicat de rutina (B)
Pneumonia adultului: monitorizare <i>(pentru copii, vezi Sectiunea M)</i> F5	Rx toracic (I)	Indicat (A)

PACHET AMBULATOR

Epanșament pleural F6	Rx toracic (I)	Indicat (B)
	Echografie (0)	Indicat (B)
Hemoptizii F7	Rx toracic (I)	Indicat (B)
	CT (III)	Investigație specializată (B)
Afectiune pulmonară nespecifică F8	CT (II)	Indicat (B)
G. Sistemul gastrointestinal		
Tractul digestiv		
Disfagie G1	Examen baritat (II)	Indicat (B)
Durere toracică – hernie hiatală sau reflux gastroesofagian G2	Examen baritat (III)	Nu e indicat de rutină (C)
Perforație esofagiană G3	Rx toracic (I)	Indicat (B)
Sangerare gastrointestinală acută: hematemeză, melena G4	Rx abdominal (II)	Nu e indicat de rutină (B)
	Examen baritat (II)	Nu e indicat de rutină (A)
	Endoscopie (0)	Investigație specializată (B)
Dispepsia la pacientul <45 ani G5	Endoscopie (0) Tranzit baritat (II)	Nu e indicat de rutină (C)
Dispepsia la pacientul >45 ani G6	Endoscopie (0) Tranzit baritat (II)	Indicat (C)
Urmărirea ulcerului G7	Tranzit baritat (II)	Nu e indicat de rutină (B)

PACHET AMBULATOR

Interventie chirurgicala gastro-intestinala superioara anterioara (veche) G8	Tranzit baritat (II)	Nu e indicat de rutina (B)
Sangerare intestinala cronica sau recurenta G9	Examen baritat intestin subtire (II)	Nu e indicat initial (C)
Durere abdominala acuta – perforare – obstructie G10	Rx toracic (I) (ortostatism) si Rx abdominal (II)	Indicat (B)
	CT (II)	Investigatie specializata (B)
Ocluzia intestinului subtire G11	Rx abdominal Examinari de contrast (II) sau CT (III)	Indicat (A) Investigatie specializata (B)
Ocluzia cronica sau recurenta a intestinului subtire G12	Examen baritat intestin subtire (II)	Indicat (B)
Boli ale intestinului subtire suspectate (ex. boala Crohn) G13	Examen baritat intestin subtire (II)	Indicat (C)
Tumora intestinului gros sau boala inflamatorie intestinala: durere, sangerare, modificare de tranzit intestinal G14	Sigmoidoscopie / Colonoscopie Irigografie (III)	Investigatie specializata (B)
Boli intestinale inflamatorii ale colonului G15	Rx Abdominal (II) Irigografie (III)	Indicat (B) Investigatie specializata (B)
Boli intestinale inflamatorii ale colonului - monitorizare G16	Colonoscopie Irigografie (III)	Nu e indicat de rutina (B)
Probleme abdominale generale		
Masa palpabila abdominala G17	RXA (II)	Nu e indicat de rutina (C)
	Echo abdominal (0)	Indicat (B)
	CT (III)	Indicat (A)
Malabsorbtie G18	Examinarea cu bariu a intestinului subtire (II)	Nu e indicat de rutina (B)
Constipatie <i>(pentru copii, vezi Sectiunea M)</i>	Rx Abdominal (II)	Nu e indicat de rutina (C)

PACHET AMBULATOR

G19		
Metastaze hepatice	Echo abdominal (0)	Indicat (B)
G20	CT (II) sau RMN (0)	Investigatie specializata (B)
Hemangiom hepatic (evidentiat ecografic) pentru Dg Diferential	G21	CT (III) sau RMN (0)
Icter	Echo abdominal (0)	Indicat (B)
G22		
Patologie biliara (ex. calculi)	G23	Rx Abdominal (II)
		Echo abdominal (0)
		Indicat (B)
Pancreatita acuta	G24	Rx Abdominal (II)
		Echo abdominal (0)
		CT (III) sau RMN (0)
		Nu e indicat de rutina (B)
Pancreatita cronica	G25	Rx Abdominal (II)
		Echo abdominal (0) sau CT (cu substanta de contrast)
		Indicat (B)
		ERCP (II)
		Investigatie specializata (C)
Tumora pancreatica	G26	Echo abdominal (0)
		CT (III) sau RMN (0)
		Indicat (B)
Insulinom	G27	Imagistica
		Specializat
H. Sistemul uro-genital si glande suprarenale		
Hematuria macroscopica sau microscopica	H1	Echo abdominal(0) + Rx Abdominal (II) sau Urografie IV (II)
		Nu e indicat de rutina (B)
Hipertensiunea arteriala secundara (fara boala renala dovedita)	H2	Urografie IV (II)
		Nu e indicat de rutina (A)
Hipertensiunea arterial secundara: la adultii tineri sau pacientii care nu raspund la tratamentul medical		Echo renala (0)
		Medicina nucleara (II)
		Indicat (B)
		Investigatie specializata (B)

PACHET AMBULATOR

	H3	Angiografie (cu substractie digitala) (III), Angiografie CT (III) sau Angiografie RMN (0)	Investigatie specializata (C)
Insuficienta renala	H4	Echografie (0) + Rx abdominal (II) Imagistica (II)	Indicat (B) Investigatie specializata (B)
Colica renala, durere lombara	H5	Echografie (II) sau Urografie IV (0) Rx Abdominal (II) sau CT (III)	Indicat (B)
Calculi renali (in absenta colicii acute)	H6	Echo (0) + Rx Abdominal (II)	Indicat (C)
Masa tumorala renala	H7	Echo (0)	Indicat (B)
		Rx Abdominal (II) + Urografie IV (II)	Nu e indicat de rutina (C)
Afectarea prostatei	H8	Echo (0) Urografie IV (II)	Indicat (B) Nu e indicat de rutina (B)
Afectare maligna a prostatei	H9	Echo (0)	Investigatie specializata (B)
Retentie de urina	H10	Echo (0) Urografie IV (II)	Indicat (C) Nu e indicat de rutina (B)
Tumora sau durere scrotala	H11	Echografie (0)	Indicat (B)
Torsiune testiculara (de cordon spermatic)	H12	Echografie (0)	Investigatie specializata (C)
Infectiile de tract urinar la adulti <i>(pentru copii, vezi Sectiunea M)</i>	H13	Echografie (0) + Rx Abdominal (II) sau Urografie IV (II)	Nu e indicat de rutina (C)
Tumori medulo-suprarenale		CT (III) sau	Investigatie specializata (B)

PACHET AMBULATOR

H14	RMN (0)	
Leziuni corticale suprarenale, sindromul Cushing H15	CT (III) sau RMN (0)	Investigatie specializata (B)
I. Obstetrica si ginecologie		
NB: este necesar ca echipamentele de ecografie transvaginala (US TV) sa fie disponibile in toate sectiile ce realizeaza Echo pelvin		
Depistare (screening) in timpul sarcinii I1	Echografie (0)	Indicat (C)
Suspiciune de sarcina patologica (mola) I2	Echografie (0)	Nu e indicat de rutina (C)
Suspiciune de sarcina extrauterina I3	Echografie (0)	Indicat (B)
Masa tumorala pelvina suspecta I4	Echografie (0) sau RMN(0)	Indicat (C)
Dureri pelvine, inclusiv suspiciune de boala inflamatorie pelvina si de endometrioza I5	Echografie (0) RMN (0)	Indicat (C) Investigatie specializata (C)
Avorturi spontane multiple (pierderi de sarcina recurente) I6	Echografie (0) RMN (0)	Indicat (C) Investigatie specializata (C)
J. Bolile sanului		
Paciente asimptomatice		
Depistare (screening de san) J1	Mamografie (<i>o singura incidenta</i>) (I)	Indicatii numeroase
Istoric familial de cancer de san J2	Mamografie (I)	Examinare specializata (C)
Pacienti simptomatice		
Suspiciune clinica de cancer de san (diagnostic)	Mamografie (I), Ecografie san (0)	Indicat (B) Investigatie specializata (B)

PACHET AMBULATOR

	J3	RMN (0)	Investigatie specializata (B)
Durere, tensiune sau sensibilitate mamara generalizata, sau ombilicare veche a mamelonului	J4	Mamografie (I) sau Echografie (0)	Nu e indicat de rutina (C)
Mastodiniile ciclice	J5	Mamografie (I)	Nu e indicat de rutina (B)
Boala mamara Paget	J6	Mamografie (I)	Indicat (C)
Bolile inflamatorii ale sanului	J7	Echografie (0)	Indicat (B)
Cancerul de san Stadializare: generala	J8	Scintigrafie osoasa (II)	Indicat (B)
		US ficat (0)	Nu e indicat de rutina (C)
Monitorizarea cancerului de san (boala inactiva)	J9	Mamografie (I)	Indicat (A)
K. Traume			
Craniul: general			
Craniul: risc redus de traumatism intracranian			
<ul style="list-style-type: none"> • orientat complet • fara amnezie • fara afectari neurologice • fara afectarea grava a scalpului • fara hemoatoame 	K1	Rx craniu (I) CT (II)	Nu e indicat de rutina (C) Nu e indicat de rutina (C)
Craniul: risc mediu de traumatism intracranian			
<ul style="list-style-type: none"> • Pierderea cunostintei sau amnezie • Mecanisme violente de traumatism • Contuzie scalp, tumefactie sau taietura pana la os sau >5 cm • Simptome sau semne neurologice (durere de cap, 		CT (II) sau Rx craniu (I)	Indicat (B)

PACHET AMBULATOR

<p>vomitat de minimum 2 ori, revenire la medic)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Istoric sau examinare inadecvata (epilepsie / cs.alcool / copil etc.) • Copil <5 ani: traumatism nonaccidental suspectat, fontanela tensionata, cazatura de la >60 cm sau pe suprafata dura <p style="text-align: right;">K2</p>		
Craniu: risc inalt de traumatism intracranian		
<ul style="list-style-type: none"> • Suspectare de corp strain sau traumatism cranian penetrant • Constienta redusa sau dezorientare • Simptome sau semne neurologice focale • Convulsii • Fractura craniana sau diastaza suturala indicata de RXS • Sindrom de oboseala cronica de la nas sau SOC/ sangerare din ureche • Stare sistemica instabila impiedicand transferul in sectia neurologie • Diagnostic incert <p style="text-align: right;">K3</p>	CT (II)	Indicat (B)
Craniu: risc foarte inalt de traumatism intracranian		
<ul style="list-style-type: none"> • Deteriorarea constientei sau semne neurologice (ex. modificari pupila) • Confuzie sau coma persistenta in pofida resuscitarii • Fontanela tensionata sau diastaza suturala • Traumatism deschis sau penetrant • Fractura craniana cu infundare sau cominutiva • Fractura de baza de craniu <p style="text-align: right;">K4</p>	CT (II)	Indicat (B)
Trauma nazala	Rx craniu (I) Rx masiv facial (I), Rx oase nazale (I)	Nu e indicat de rutina (C)

PACHET AMBULATOR

K5		
<i>Trauma orbitala: traumatism provocat de obiect contondent</i>	<i>Rx masiv facial (I)</i>	<i>Indicat (B)</i>
K6		
<i>Trauma orbitala: traumatism penetrant</i>	<i>Rx orbita (I)</i>	<i>Indicat (C)</i>
K7		
	<i>Echografie (0) sau CT (II)</i>	<i>Investigatie specializata (B)</i>
<i>Trauma faciala la nivelul treimeii mijlocii a fetei</i>	<i>Rx masiv facial (I)</i>	<i>Indicat (B)</i>
K8		
	<i>CT (doza redusa)(II)</i>	<i>Investigatie specializata (B)</i>
<i>Trauma mandibulara</i>	<i>Rx mandibula (I) sau ortopantomograma (OPG) (I)</i>	<i>Indicat (C)</i>
K9		
Coloana cervicala		
<i>Pacient constient care prezinta numai leziune/traumatism cranian si/sau facial</i>	<i>Rx coloana vertebrala (I)</i>	<i>Nu e indicat de rutina (C)</i>
K10		
<i>Trauma craniana cu stare de inconstienta (vezi K3/4)</i>	<i>Rx coloana vertebrala (I)</i>	<i>Indicat (B)</i>
K11		
<i>Leziune in zona gatului: cu durere</i>	<i>Rx coloana vertebrala (I)</i>	<i>Indicat (B)</i>
K12		
	<i>CT (II) sau RMN (0)</i>	<i>Investigatie specializata (B)</i>
<i>Leziune in zona gatului: cu deficit neurologic</i>	<i>Rx (I)</i>	<i>Indicat (B)</i>
K13		
	<i>RMN (0)</i>	<i>Indicat (B)</i>
<i>Leziune in zona gatului: cu durere dar RX initial normal; leziuni ligamentare suspectate</i>	<i>Rx coloana vertebrala ; flexie si extensie (I)</i>	<i>Investigatie specializata (B)</i>
K14		
Coloana toracica si lombara		
<i>Trauma: fara durere, fara deficit neurologic</i>	<i>Rx (II)</i>	<i>Nu e indicat de rutina (B)</i>
K15		

PACHET AMBULATOR

<i>Trauma: cu durere, fara deficit neurologic, sau pacientul nu este apt sa fie evaluat</i> K16	<i>Rx in zona dureroasa (II)</i>	<i>Indicat (B)</i>
<i>Trauma: cu deficit neurologic – durere</i> K17	<i>Rx (II)</i>	<i>Indicat (B)</i>
	<i>RMN (0)</i>	<i>Indicat (B)</i>
Pelvis si sacrum		
<i>Cadere cu incapacitatea de a suporta greutatea</i> K18	<i>Rx pelvin (I)</i> <i>si Rx sold incidenta laterala (I)</i>	<i>Indicat (C)</i>
<i>Trauma coccis sau coccidinia</i> K19	<i>Rx coccis (I)</i>	<i>Nu e indicat de rutina (C)</i>
Membre superioare		
<i>Leziune umar</i> K20	<i>Rx umar (I)</i>	<i>Indicat (B)</i>
<i>Leziune cot</i> K21	<i>RX articulatia cotului (I)</i>	<i>Indicat (B)</i>
<i>Leziune articulatie radio-carpiana</i> K22	<i>Rx artic.radio-carpiana (I)</i>	<i>Indicat (B)</i>
Membre inferioare		
<i>Leziune genunchi (trauma cadere/obiect contondent)</i> K23	<i>Rx genunchi (I)</i>	<i>Nu e indicat de rutina (B)</i>
<i>Leziune glezna</i> K24	<i>Rx glezna (I)</i>	<i>Nu e indicat de rutina (B)</i>
<i>Leziune picior</i> K25	<i>Rx picior (I)</i>	<i>Nu e indicat de rutina (B)</i>
<i>Fractura de stres</i>	<i>Rx (I)</i>	<i>Indicat (B)</i>
	<i>RMN (0)</i>	<i>Indicatie specializata (B)</i>

PACHET AMBULATOR

K26		
Corpul strain		
Leziune de tesuturi moi: corp strain (metalic, sticla, lemn lacuit)	Rx (I)	Indicat (B)
K27		
Leziune de tesuturi moi: corp strain (plastic, lemn)	Rx (I)	Nu e indicat de rutina (B)
K28	Echografie (0)	Indicat (B)
Corp strain inghitit suspectat in faringe sau regiunea esofagiana superioara	RX tesuturi moi sau gat (I)	Indicat (C)
K29	RXA (II)	Nu e indicat de rutina (B)
(pentru copii, vezi sectiunea M)		
Corp strain inghitit: plan si mic (ex. moneda)	Rx torace (I)	Indicat (B)
K30	Rx abdominal (II)	Nu e indicat de rutina (B)
Corp strain ascutit sau potential otravitor, inghitit: (ex. baterie)	Rx abdominal (II)	Indicat (B)
K31	Rx torace (I)	Nu e indicat de rutina (B)
Corp strain inghitit: obiect mare (ex. proteza dentara)	Rx torace (I)	Indicat (B)
K32		
Torace		
Trauma toracica: minora	Rx torace (I)	Nu e indicat de rutina (B)
K33		
Trauma toracica: moderata	Rx torace (I)	Indicat (B)
K34		
Leziune prin injunghiere	Rx torace (I)	Indicat (C)
K35		
Fractura sternala	Rx lateral stern (I)	Indicat (C)
K36		
Abdomen (inclusiv rinichi). Leziune injunghiata sau cu obiect contondent	Rx abdominal (II) in clinostatism + Rx torace in ortostatism (I)	Indicat (B)
K37		
Trauma renala	Imagistica (CT(II)) sau Urografie IV	Indicat (B)

PACHET AMBULATOR

K38		
Trauma majora		
Trauma majora – examen general pacient inconstient sau confuz	Rx coloana (I), Rx pelvis (I), CT craniu (II)	Indicat (B)
K39		
Trauma majora – abdomen / bazin	Rx toracic (I), RX pelvis (I)	Indicat (B)
K40		
	CT abdominal (III)	Indicat (B)
Trauma majora – torace	RX torace (I)	Indicat (B)
K41		
	CT toracic (III)	Indicat (B)
L. Cancer (pt diagnosticare si monitorizarea bolii oncologice se vor utiliza standardele RECIST)		
Parotida		
Diagnostic	Echografie (0)	Indicat (B)
L1		
	RMN (0) sau CT (II)	Indicat (B)
Stadializare	RMN (0) sau CT (II)	Indicat (B)
L2		
Laringe		
Diagnostic	Imagistica	Nu e indicat de rutina (B)
L3		
Stadializare	CT (II) sau RMN (0)	Indicat (B)
L4		
Tiroida		
Diagnostic	Echografie tiroidiana (0) si Medicina nucleara (I)	Indicat (A)
L5		
Stadializare	CT (II) sau RMN (0)	Indicat (B)
L6		
	Medicina nucleara (IV)	Indicat (B)
Plamani		
Diagnostic	Rx toracic(I)	Indicat (B)
L7		
	CT (III)	Indicat (B)

PACHET AMBULATOR

Stadializare	L8	CT torace, abdomen superior. (III)	Indicat (B)
		RMN (0)	Investigatie specializata (B)
		PET-FDG (IV)	Investigatie specializata (B)
Esofag			
Diagnostic	L9	Tranzit baritat(II) <i>In disfagie inainte de evaluarea endoscopica</i>	Indicat (B)
Stadializare	L10	CT (III)	Indicat (B)
		Echografie transesofagiana (0)	Indicat (A)
Ficat: leziune primara			
Diagnostic	L11	Echografie (0)	Indicat (B)
		RMN (0) sau CT (III)	Indicat (B)
Stadializare	L12	RMN (0) sau CT (III)	Indicat (B)
Ficat: leziune secundara			
Diagnostic	L13	Echografie (0)	Indicat (B)
		CT (III) sau RMN (0)	Indicat (B)
Pancreas			
Diagnostic	L14	Imagistica (<i>abordare gradual, Echo, CT, RMN</i>)	Indicat (B)
Stadializare	L15	CT (III) sau RMN (0)	Indicat (B)
Colon si rect			
Diagnostic	L16	Irigografie (III) sau colonoscopie	Indicat (B)
Stadializare	L17	Echografie (0)	Indicat (B)
		CT (II) sau RMN (0) abdomen, bazin	Indicat (B)
Recurenta	L17	Echografie hepatica (0)	Indicat (B)
		CT (III) sau RMN (0) abdomen, bazin	Indicat (B)

PACHET AMBULATOR

	L18		
Rinichi			
Diagnostic		Echografie (0)	Indicat (B)
	L19		
Stadializare		CT (III) sau RMN (0) abdomen	Indicat (B)
		CT (III) toracic	Nu e indicat de rutina (B)
Recurenta		CT (III) abdomen	Indicat (B)
	L21		
Vezica			
Diagnostic		Imagistica (<i>cistoscopie</i>)	Nu e indicat de rutina (B)
	L22		
Stadializare		Urografie IV (II)	Indicat (B)
		CT (III) sau RMN (0) abdomen si bazin	Indicat (B)
	L23		
Prostata			
Diagnostic		Echografie transrectala (0)	Indicat (B)
	L24		
Stadializare		RMN (0) / CT (III) bazin	Investigatie specializata (B)
		Scintigrafie osoasa (II)	Indicat (A) (<i>PSA semnificativ crescut</i>)
	L25		
Testicule			
Diagnostic		Echografie (0)	Indicat (B)
	L26		
Stadializare		CT (III) torace, abdomen, bazin	Indicat (B)
	L27		
Monitorizare		CT (III) abdomen	Indicat (B)
Ovare			
Diagnostic		Echografie (0)	Indicat (B)
	L28	sau RMN (<i>diagnostic diferential</i>)	
Stadializare		CT (III) / RMN (0) abdomen, bazin	Investigatie specializata (B)
	L29		

PACHET AMBULATOR

Monitorizare L30	CT (III) abdomen, bazin	Investigatie specializata (B)
Uter: col uterin		
Diagnostic L31	Imagistica	Nu e indicat de rutina (B)
Stadializare L32	RMN (0) / CT (III) abdomen si bazin	Indicat (B)
Recidiva L33	RMN (0) / CT (III) abdomen si bazin	Investigatie specializata (B)
Uter: corp uterin		
Diagnostic L34	Echografie (0) sau RMN (0)	Indicat (B)
Stadializare L35	RMN (0) sau CT (III)	Investigatie specializata (B)
Limfom		
Diagnostic L36	CT (III)	Indicat (B)
	Medicina nucleara <i>cu criterii de eligibilitate</i> (III)	Investigatie specializata (B)
Stadializare L37	CT (III) torace, abdomen, bazin	Indicat (B)
Monitorizare L38	CT (III) sau RMN (0)	Indicat (B)
	Medicina nucleara <i>cu criterii de eligibilitate</i> (III)	Investigatie specializata (B)
Tumori musculo-scheletale		
Diagnostic L39	Rx (I) + RMN (0)	Indicat (B)
Stadializare L41	RMN (0) pt afectare locala + CT toracic (III)	Investigatie specializata (C)
Metastaze pentru tumora primara necunoscuta		
Diagnosticul leziunii primare L42	Imagistica	Nu e indicat de rutina (C)
San – vezi Sectiunea J		

PACHET AMBULATOR

M. Pediatrie		
<i>Minimalizati iradierea copiilor, in special a celor cu probleme pe termen lung (pentru leziuni craniene la copii vezi Sectiunea K Traume) CNS</i>		
Boli congenitale M1	RMN (0)	Indicat (C)
Craniu cu aspect anormal – hidrocefalie – suturi neobisnuite M2	Echografie (0) Rx Craniu (I)	Indicat (B) Investigatie specializata (C)
Epilepsie M3	Rx Craniu (I) RMN (0)	Nu e indicat de rutina (B) Investigatie specializata (B)
Surditate la copii M4	CT (II) si RMN (0)	Investigatie specializata (C)
Hidrocefalie – malfunctie de sunt M5	Rx (I)	Indicat (B)
	Echografie (0) sau RMN (0)	Indicat (B)
Intarziere in dezvoltare – paralizie cerebrala M6	RMN cerebral (0)	Investigatie specializata (B)
Cefalee M7	Rx craniu (I)	Nu este indicat de rutina (B)
	RMN (0) sau CT (II)	Investigatie specializata (B)
Sinuzita vezi si A13 M8	Rx sinus (I)	Nu e indicat de rutina (B)
Gat si coloana – pentru traume vezi Sectiunea K		
Torticolis fara trauma M9	Rx (I)	Nu e indicat
Durere de spate sau in zona gatului M10	Rx (I) RMN (0)	Indicat (B) Investigatie specializata (B)
Spina bifida occulta M11	Rx (I)	Nu e indicat de rutina (B)
Locomotor		
Leziuni ale membrelor: comparatie cu partea opusa	Rx (I)	Nu e indicat de rutina (B)

PACHET AMBULATOR

	M12		
Deficit statural, tulburari de crestere	M13	Rx (I) pentru varsta osoasa RMN cerebral	Indicat la intervale adecvate (B) Investigatie specializata (B)
Disfunctionalitati ale articulatiei soldului	M14	Echografie (0)	Indicat (B)
		Rx bazin (I)	Indicat (C)
		RMN (0)	Investigatie specializata (B)
Durere osoasa localizata		Rx (I) <i>Echografie pt dg diferential in suspiciune osteomielita</i>	Indicat (B)
	M15	RMN (0)	Investigatie specializata (B)
Dislocare sold		Echografie articulara (0)	Indicat (B)
	M16		
Cardio-toracic			
IACRI	M17	Rx toracic (I)	Nu e indicat de rutina (B)
Tuse productiva recurenta	M18	Rx toracic (I)	Nu e indicat de rutina (C)
Corp strain inhalat (suspectare) (vezi Sectiunea K)	M19	Rx toracic (I)	Indicat (B)
Respiratie suieratoare (wheeze)	M20	Rx toracic (I)	Nu e indicat de rutina (B)
Sunet respirator acut (stridor)	M21	Rx a gatului (I)	Nu e indicat de rutina (B)
Murmur al inimii	M22	Rx toracic (I)	Nu e indicat de rutina (C)
Gastrointestinal – pentru probleme abdominale generale vezi si Sectiunea G			
Intususceptie	M23	Rx abdominal (II)	Indicat (C)
		Imagistica ulterioara	Investigatie specializata (B)
Inghitire corp strain (vezi Sectiunea K)		Rx abdominal (II)	Nu e indicat de rutina (C)
		Rx toracic	Indicat (C)

PACHET AMBULATOR

	M24		
Trauma abdominala minora	M25	Rx abdominal (II)	Nu e indicat de rutina (C)
Incter neonatal persistent	M26	Echografie (0)	Indicat (B)
Sangerare rectala	M27	Rectosigmoidoscopie	Investigatie specializata (B)
Constipatia	M28	Rx abdominal (II)	Nu e indicat de rutina (C)
		Irigografie	Nu e indicat de rutina (B)
Masa tumorală abdominală/ pelvina palpabilă	M29	Echografie (0) și Rx Abdominal (II)	Indicat (B)
Uroradiologie			
Enurezis	M30	Imagistica	Nu e indicat de rutina (B)
Incontinenta urinară	M31	Echografie (0)	Indicat (B)
		Urografie IV (II)	Indicat
Ectopie testiculară	M32	Echografie (0)	Indicat (B)
Diagnostic antenatal de dilatare a tractului urinar	M33	Echografie (0)	Indicat (B)
Infectie confirmată de tract urinar	M34	Imagistica (Echografie (0) / cistografie (III))	Investigatie specializata (C)

* Propunerea are la baza recomandările "EU Referral guidelines for imaging"

NOTA: Criteriile de eligibilitate și frecvența recomandărilor vor fi detaliate ulterior