

Examenul de bacalaureat național 2018
Proba E. c)
Matematică M_tehnologic

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

Varianta 9

Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale

- Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- Nu se acordă fracții de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1.	$\left(2 - \frac{1}{2}\right) \left(3 - \frac{1}{3}\right) \left(4 - \frac{1}{4}\right) \cdot \frac{1}{5} = \frac{4-1}{2} \cdot \frac{9-1}{3} \cdot \frac{16-1}{4} \cdot \frac{1}{5} = \\ = \frac{3}{2} \cdot \frac{8}{3} \cdot \frac{15}{4} \cdot \frac{1}{5} = 3$	3p 2p
2.	$a^2 + 2 + (a+1)^2 + 2 = 5 \Leftrightarrow 2a^2 + 2a = 0 \\ a = -1 \text{ sau } a = 0$	3p 2p
3.	$5^{2x-4} = 5^2 \Leftrightarrow 2x - 4 = 2 \\ x = 3$	3p 2p
4.	Mulțimea M are 9 elemente, deci sunt 9 cazuri posibile În mulțimea M sunt 5 numere divizibile cu 10, deci sunt 5 cazuri favorabile $p = \frac{\text{nr. cazuri favorabile}}{\text{nr. cazuri posibile}} = \frac{5}{9}$	1p 2p 2p
5.	$M(4,3) \\ OM = 5$	2p 3p
6.	$\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}, \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}, \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ $2\sin 45^\circ \cdot \cos 45^\circ - \sin^2 45^\circ - \cos^2 60^\circ = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$	3p 2p

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1.a)	$\det A = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} = 5 \cdot 8 - 4 \cdot 1 = \\ = 40 - 4 = 36$	3p 2p
b)	$\det(M(a)) = \begin{vmatrix} a-2 & 1 \\ 4 & a+1 \end{vmatrix} = a^2 - a - 6$ $M(a)$ este inversabilă $\Leftrightarrow \det(M(a)) \neq 0 \Leftrightarrow a \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 3\}$	2p 3p
c)	$\begin{pmatrix} xy - 2x - 2y + 8 & x + y - 1 \\ 4x + 4y - 4 & xy + x + y + 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} \Leftrightarrow xy = 1 \text{ și } x + y = 2$ $x = 1, y = 1$	3p 2p
2.a)	$f(1) = 1^3 + m \cdot 1 - 6 = \\ = 1 + m - 6 = m - 5, \text{ pentru orice număr real } m$	3p 2p

b)	$x_1 + x_2 + x_3 = 0, \quad x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = m \Rightarrow x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = -2m$ $-2m = 4 \Leftrightarrow m = -2$	3p 2p
c)	$X^3 - 7X - 6 = X^3 + (p+1)X^2 + (p+q)X + q$ $p = -1, \quad q = -6$	3p 2p

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

1.a)	$f'(x) = 3x^2 - 3 \cdot 2x =$ $= 3x^2 - 6x = 3x(x-2), \quad x \in \mathbb{R}$	3p 2p
b)	$f(1) = 1, \quad f'(1) = -3$ Ecuația tangentei este $y - f(1) = f'(1)(x-1)$, adică $y = -3x + 4$	2p 3p
c)	$f'(x) \leq 0$, pentru orice $x \in [0, 2] \Rightarrow f$ este descrescătoare pe $[0, 2]$ și $f'(x) \geq 0$, pentru orice $x \in [2, +\infty)$ $\Rightarrow f$ este crescătoare pe $[2, +\infty)$ $f(x) \geq f(2)$, pentru orice $x \in [0, +\infty)$ și $f(2) = -1$, deci $f(x) \geq -1$, pentru orice $x \in [0, +\infty)$	2p 3p
2.a)	$\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^1 (3x^2 - x) dx = \left(x^3 - \frac{x^2}{2} \right) \Big _{-1}^1 =$ $= \left(1 - \frac{1}{2} \right) - \left(-1 - \frac{1}{2} \right) = 2$	3p 2p
b)	Cum $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} (3x^2 - x) = 2$, $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \left(2 + \frac{1}{x} \cdot \ln x \right) = 2$ și $f(1) = 2$, obținem $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$, deci funcția f este continuă în $x = 1$ Cum funcția f este continuă pe $(-\infty, 1)$ și pe $(1, +\infty)$, obținem că f este continuă pe \mathbb{R} , deci funcția f admite primitive pe \mathbb{R}	3p 2p
c)	$\int_0^2 f(x) dx = \int_0^1 (3x^2 - x) dx + \int_1^2 \left(2 + \frac{1}{x} \cdot \ln x \right) dx = \left(x^3 - \frac{x^2}{2} \right) \Big _0^1 + 2x \Big _1^2 + \frac{\ln^2 x}{2} \Big _1^2 = \frac{5 + \ln^2 2}{2}$ $\frac{5 + \ln^2 2}{2} = \frac{n^2 - 4 + \ln^2 2}{2} \Leftrightarrow n^2 - 9 = 0$ și, cum n este număr natural, obținem $n = 3$	3p 2p