

**Examenul de bacalaureat național 2019**

**Proba E. c)**

**Matematică M\_mate-info**

**Clasa a XI-a**

**BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE**

**Simulare**

*Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică*

*Filiera vocațională, profilul militar, specializarea matematică-informatică*

- Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

**SUBIECTUL I**

- Pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte.
- Nu se acordă punctaje intermediare.

**SUBIECTUL al II-lea și SUBIECTUL al III-lea**

- Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- Nu se acordă fracții de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.

**SUBIECTUL I**

**(30 de puncte)**

1.	B	5p
2.	A	5p
3.	C	5p
4.	D	5p
5.	A	5p
6.	A	5p

**SUBIECTUL al II-lea**

**(30 de puncte)**

1.a)	$D(0,1) = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} =$ $= 0 + 0 + 4 - 0 - 0 - 0 = 4$	2p  3p
b)	$D(a,1) = \begin{vmatrix} a & 2 & 1 \\ a & a & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = a^2 - 4a + 4 =$ $= (a-2)^2 \geq 0, \text{ pentru orice număr real } a$	3p  2p
c)	$D(m,n) = m^2 + m + 4n^2 - 5mn, \text{ unde } m \text{ și } n \text{ sunt numere întregi impare}$ <p style="margin-left: 20px;">Cum <math>m</math> și <math>n</math> sunt numere întregi impare, <math>m^2</math> este impar, <math>4n^2</math> este par și <math>5mn</math> este impar, deci numărul întreg <math>D(m,n)</math> este impar, de unde obținem că <math>D(m,n) \neq 0</math></p>	2p  3p
2.a)	$A(-x) + A(x) = \begin{pmatrix} -x & 1 & x \\ 1 & 0 & 1 \\ x & 1 & -x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x & 1 & -x \\ 1 & 0 & 1 \\ -x & 1 & x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} =$ $= 2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = 2A(0), \text{ pentru orice număr real } x$	3p  2p
b)	$A(x)A(y) = \begin{pmatrix} 2xy+1 & 0 & -2xy+1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2xy+1 & 0 & 2xy+1 \end{pmatrix}, \quad A(2xy) = \begin{pmatrix} 2xy & 1 & -2xy \\ 1 & 0 & 1 \\ -2xy & 1 & 2xy \end{pmatrix}, \text{ pentru orice numere reale } x \text{ și } y$	2p

	$A(x)A(y) - A(2xy) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A(x)A(y) - A(2xy)) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0, \text{ pentru orice numere reale } x \text{ și } y$	<b>3p</b>
<b>c)</b>	$A(x)A\left(\frac{1}{2x}\right) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_3, \text{ pentru orice număr real nenul } x$ $\underbrace{2I_3 + 2I_3 + \dots + 2I_3}_{\text{de 2019 ori } 2I_3} = 4038I_3, \text{ deci } m = 4038$	<b>3p</b> <b>2p</b>

**SUBIECTUL al III-lea**
**(30 de puncte)**

<b>1.a)</b>	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x+2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{x\left(1 + \frac{2}{x}\right)} =$ $= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{1}{x}}{1 + \frac{2}{x}} = 1$	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>b)</b>	$a_n = \frac{n+1}{n+2}, \text{ deci } a_n > 0, \text{ pentru orice număr natural } n, n \geq 1$ <p>Cum <math>a_n = 1 - \frac{1}{n+2} &lt; 1</math>, pentru orice număr natural <math>n, n \geq 1</math>, sirul <math>(a_n)_{n \geq 1}</math> este mărginit</p>	<b>2p</b> <b>3p</b>
<b>c)</b>	$\text{c)} \lim_{n \rightarrow +\infty} n\left(\sqrt{f(n)} - 1\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(f(n) - 1)}{\sqrt{f(n)} + 1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n\left(\frac{n+1}{n+2} - 1\right)}{\sqrt{f(n)} + 1} =$ $= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-n}{(n+2)\left(\sqrt{f(n)} + 1\right)} = -\frac{1}{2}$	<b>2p</b> <b>3p</b>
<b>2.a)</b>	<p>Pentru orice număr real <math>a</math>, funcția <math>f</math> este continuă pe <math>(-\infty, 0)</math> și pe <math>(0, +\infty)</math></p> $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left( a + \frac{\sin x}{x} \right) = a + 1, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x^2 + 2x} = 0 \text{ și } f(0) = 0, \text{ deci funcția } f \text{ este continuă pe } \mathbb{R} \Leftrightarrow a = -1$	<b>2p</b> <b>3p</b>
<b>b)</b>	$a = 1 \Rightarrow f(x) = 1 + \frac{\sin x}{x}, x \in (-\infty, 0)$ $\left  \frac{\sin x}{x} \right  \leq \frac{1}{ x } \text{ și } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{ x } = 0$ <p>Obținem <math>\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1</math>, deci dreapta de ecuație <math>y = 1</math> este asimptotă orizontală spre <math>-\infty</math> la graficul funcției <math>f</math></p>	<b>1p</b> <b>2p</b> <b>2p</b>
<b>c)</b>	$f(0) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ și } f \text{ este continuă pe } [0, +\infty), \text{ deci mulțimea valorilor funcției } f \text{ conține intervalul } [0, +\infty)$ <p>Cum pentru orice număr real <math>a,  a  \in [0, +\infty)</math>, ecuația <math>f(x) =  a </math> are cel puțin o soluție</p>	<b>3p</b> <b>2p</b>