

Examenul de bacalaureat național 2020
Proba E. c)

Matematică *M_pedagogic*

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

Test 3

Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare

- Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1.	$5\sqrt{3} - \sqrt{32} + \sqrt{18} + \sqrt{2} + \sqrt{4} - \sqrt{75} = 5\sqrt{3} - 4\sqrt{2} + 3\sqrt{2} + \sqrt{2} + 2 - 5\sqrt{3} = \\ = (5\sqrt{3} - 5\sqrt{3}) + (-4\sqrt{2} + 3\sqrt{2} + \sqrt{2}) + 2 = 2$	3p 2p
2.	$f(1) = 2 + m$ $f(1) = 1 \Rightarrow 2 + m = 1$, deci $m = -1$	2p 3p
3.	$x^2 - 9 = 16 \Leftrightarrow x^2 - 25 = 0$ $x = -5$ sau $x = 5$, care convin	2p 3p
4.	$x + \frac{20}{100} \cdot x - 180 = 300$, unde x este prețul inițial al obiectului $x = 400$ de lei	3p 2p
5.	Punctul $M\left(\frac{3}{2}, 2\right)$ este mijlocul segmentului AB $CM = \frac{5}{2}$	2p 3p
6.	$\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ $\cos 60^\circ = \frac{1}{2} \Rightarrow \sqrt{3} \cdot \sin 60^\circ - \cos 60^\circ = \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1$	2p 3p

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1.	$(-1) \circ 1 = 2 \cdot (-1) \cdot 1 - 2(-1+1) = \\ = -2 - 2 \cdot 0 = -2$	3p 2p
2.	$x \circ y = 2xy - 2(x+y) = 2yx - 2(y+x) = \\ = y \circ x$, pentru orice numere reale x și y , deci legea de compozitie „ \circ ” este comutativă	3p 2p
3.	$x \circ y = 2xy - 2x - 2y + 2 - 2 = \\ = 2x(y-1) - 2(y-1) - 2 = 2(x-1)(y-1) - 2$, pentru orice numere reale x și y	2p 3p
4.	$2(2-1)(2^x - 1) - 2 = 0 \Leftrightarrow 2^x - 1 = 1$ $x = 1$	3p 2p
5.	$(x+1) \circ (2x-1) - (-4) = 2(x+1-1)(2x-1-1) - 2 + 4 = 2(2x^2 - 2x + 1)$, pentru orice număr real x Cum $\Delta < 0$, obținem $2x^2 - 2x + 1 > 0$, deci $(x+1) \circ (2x-1) > -4$, pentru orice număr real x	3p 2p
6.	$2(m-1)(n-1) - 2 = 12 \Leftrightarrow (m-1)(n-1) = 7$ Cum m și n sunt numere naturale, obținem $(m, n) = (2, 8)$ sau $(m, n) = (8, 2)$	2p 3p

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

1.	$\det A = \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 - (-1) \cdot (-2) = 2 - 2 = 0$	3p 2p
2.	$A \cdot A = \begin{pmatrix} 6 & -6 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$ $A \cdot A - B = \begin{pmatrix} 6 & -6 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	3p 2p
3.	$A \cdot B = \begin{pmatrix} 18 & -14 \\ -9 & 7 \end{pmatrix} \Rightarrow A \cdot B - I_2 = \begin{pmatrix} 17 & -14 \\ -9 & 6 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A \cdot B - I_2) = -24$ $B \cdot A = \begin{pmatrix} 16 & -16 \\ -9 & 9 \end{pmatrix} \Rightarrow B \cdot A - I_2 = \begin{pmatrix} 15 & -16 \\ -9 & 8 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(B \cdot A - I_2) = -24$, de unde obținem $\det(A \cdot B + I_2) = \det(B \cdot A - I_2)$	2p 3p
4.	$B - A + xI_2 = \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4+x & -2 \\ -2 & 2+x \end{pmatrix}$, pentru orice număr real x $\begin{pmatrix} 4+x & -2 \\ -2 & 2+x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$, de unde obținem $x = -2$	3p 2p
5.	$I_2 + aA = \begin{pmatrix} 1+2a & -2a \\ -a & 1+a \end{pmatrix} \Rightarrow \det(I_2 + aA) = 3a + 1$, pentru orice număr real a $\det(I_2 + aA) + \det(I_2 - aA) = 3a + 1 + 3 \cdot (-a) + 1 = 2$, pentru orice număr real a	3p 2p
6.	$I_2 - A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\det(I_2 - A) = -2 \neq 0$, $(I_2 - A)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ $X = (I_2 - A)^{-1} \cdot A$, de unde obținem $X = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$	3p 2p