

Examenul de bacalaureat național 2020

Proba E. c)

Matematică *M\_mate-info*

Test 17

*Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică*

*Filiera vocațională, profilul militar, specializarea matematică-informatică*

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

- 5p 1. Arătați că, dacă  $z^2 + z + 2 = 0$ , unde  $z$  este număr complex, atunci  $z^2 + \frac{4}{z^2} = -3$ .
- 5p 2. Se consideră funcția  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \{2x\}$ , unde  $\{x\}$  reprezintă partea fracționară a lui  $x$ .  
Arătați că  $f\left(x + \frac{1}{2}\right) = f(x)$ , pentru orice număr real  $x$ .
- 5p 3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația  $3^{x+1} - 3^x = 2^{x+2} - 2^{x+1}$ .
- 5p 4. Calculați probabilitatea ca, alegând un număr  $a$  din mulțimea  $A = \{\sqrt{3}, \sqrt{4}, \sqrt{5}, \dots, \sqrt{25}\}$ , numerele 3, 4 și  $a$  să reprezinte lungimile laturilor unui triunghi dreptunghic.
- 5p 5. Se consideră paralelogramul  $ABCD$  și punctele  $M$  și  $N$  astfel încât  $\overline{AM} = \frac{1}{4}\overline{AC}$  și  $\overline{AN} = \frac{1}{3}\overline{AB}$ .  
Demonstrați că punctele  $D$ ,  $M$  și  $N$  sunt coliniare.
- 5p 6. Arătați că, dacă  $ABC$  este un triunghi oarecare, atunci  $\cos A < \frac{1}{2}\left(\frac{AB}{AC} + \frac{AC}{AB}\right)$ .

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1. Se consideră matricea  $A(m) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & m & 1 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix}$  și sistemul de ecuații  $\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ 2x + my + z = 0 \\ x - 3y + 2z = 0 \end{cases}$ , unde  $m$  este număr real.
- 5p a) Arătați că  $\det(A(m)) = m - 9$ , pentru orice număr real  $m$ .
- 5p b) Determinați numărul real  $m$  pentru care sistemul de ecuații admite soluții diferite de  $(0, 0, 0)$ .
- 5p c) Pentru  $m = 9$ , se consideră  $(x_0, y_0, z_0)$  o soluție a sistemului de ecuații, cu  $x_0, y_0$  și  $z_0$  numere reale astfel încât  $(x_0, y_0, z_0) \neq (0, 0, 0)$ . Calculați  $\frac{x_0^2 + y_0^2 - z_0^2}{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2}$ .
2. Pe mulțimea numerelor întregi se definește legea de compoziție  $x * y = xy + 5x + 5y + 20$ .
- 5p a) Arătați că  $2 * (-1) = 23$ .
- 5p b) Demonstrați că  $e = -4$  este elementul neutru al legii de compoziție „\*”.
- 5p c) Pentru  $r \in \{0, 1, 2\}$ , notăm cu  $A(r)$  mulțimea numerelor naturale care au restul  $r$  la împărțirea cu 3. Determinați numerele  $r \in \{0, 1, 2\}$  pentru care  $A(r)$  este parte stabilă a lui  $\mathbb{Z}$  în raport cu legea de compoziție „\*”.

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

1. Se consideră funcția  $f: (-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = (x-1)(e^x - e)$ .
- 5p a) Arătați că  $f'(x) = xe^x - e$ ,  $x \in (-1, +\infty)$ .

- 5p** b) Determinați ecuația tangentei la graficul funcției  $f$ , în punctul de abscisă  $x = 1$ , situat pe graficul funcției  $f$ .
- 5p** c) Determinați punctul de extrem al funcției  $f$ .
2. Se consideră funcția  $f : (-2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \frac{\ln(x+2)}{x^2+1}$ .
- 5p** a) Arătați că  $\int_0^1 \frac{f(x)}{\ln(x+2)} dx = \frac{\pi}{4}$ .
- 5p** b) Calculați  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$ .
- 5p** c) Arătați că  $\int_0^1 \left( f(x) + \frac{\operatorname{arctg} x}{x+2} \right) dx = \frac{\pi}{4} \ln 3$ .