

**Examenul de bacalaureat național 2020**

**Proba E. c)**

**Matematică  $M_{tehnologic}$**

**BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE**

**Test 14**

*Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale*

- Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

**SUBIECTUL I**

**(30 de puncte)**

<b>1.</b>	$\left(2 + \frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) \cdot \frac{15}{16} + \sqrt[3]{-8} = \frac{30+5-3}{15} \cdot \frac{15}{16} + (-2) =$ $= \frac{32}{15} \cdot \frac{15}{16} - 2 = 2 - 2 = 0$	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>2.</b>	$f(4) = 0 \Rightarrow -4 + a = 0$ $a = 4$	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>3.</b>	$2x + 1 = 25 \Rightarrow 2x = 24$ $x = 12$ , care convine	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>4.</b>	Mulțimea $A$ are 9 elemente, deci sunt 9 cazuri posibile Numerele din mulțimea $A$ care sunt multipli de 6 sunt 30, 60 și 90, deci sunt 3 cazuri favorabile $p = \frac{\text{nr. cazuri favorabile}}{\text{nr. cazuri posibile}} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$	<b>2p</b> <b>2p</b> <b>1p</b>
<b>5.</b>	$M(5,5)$ $OM = \sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}$	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>6.</b>	$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x = 1 - \left(\frac{5}{13}\right)^2 = \frac{144}{169}$ și, cum $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ , obținem $\sin x = \frac{12}{13}$ $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{12}{13} \cdot \frac{13}{5} = \frac{12}{5}$	<b>3p</b> <b>2p</b>

**SUBIECTUL al II-lea**

**(30 de puncte)**

<b>1.a)</b>	$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot 0 - 1 \cdot (-1) =$ $= 0 + 1 = 1$	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>b)</b>	$B \cdot B = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ $B \cdot B + A = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O_2$	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>c)</b>	$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ , $B \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ , $A + B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A \cdot B + B \cdot A - (A + B) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \log_2 x & 0 \\ 0 & \log_3 y \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_2 x = 1 \\ \log_3 y = 1 \end{cases}$ , de unde obținem $x = 2$ și $y = 3$ , care convin	<b>2p</b> <b>3p</b>
<b>2.a)</b>	$2020 * 5 = 2020 + \frac{5}{5} + 1 =$	<b>3p</b>

	$= 2020 + 1 + 1 = 2022$	<b>2p</b>
<b>b)</b>	$x * x = x + \frac{x}{5} + 1 = \frac{6x}{5} + 1, (x * x) * x = \left(\frac{6x}{5} + 1\right) * x = \frac{6x}{5} + 1 + \frac{x}{5} + 1 = \frac{7x}{5} + 2$	<b>2p</b>
	$\frac{7x}{5} + 2 = \frac{24}{5} \Leftrightarrow 7x + 10 = 24$ , de unde obținem $x = 2$	<b>3p</b>
<b>c)</b>	$5^x + \frac{5^{x+1}}{5} + 1 = 11 \Leftrightarrow 5^x + 5^x = 10 \Leftrightarrow 2 \cdot 5^x = 10$	<b>3p</b>
	$5^x = 5$ , de unde obținem $x = 1$	<b>2p</b>

**SUBIECTUL al III-lea**

**(30 de puncte)**

<b>1.a)</b>	$f'(x) = -3x^2 + 3 =$ $= 3(1 - x^2) = 3(1 - x)(1 + x), x \in \mathbb{R}$	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>b)</b>	$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 7}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} =$ $= f'(2) = -9$	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>c)</b>	$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1$ sau $x = 1$ $x \in [-1, 1] \Rightarrow f'(x) \geq 0$ , deci $f$ este crescătoare pe $[-1, 1]$ , $x \in [1, +\infty) \Rightarrow f'(x) \leq 0$ , deci $f$ este descrescătoare pe $[1, +\infty)$ și, cum $f(1) = 11$ , obținem $f(x) \leq 11$ , pentru orice $x \in [-1, +\infty)$	<b>2p</b> <b>3p</b>
<b>2.a)</b>	$\int_{-1}^1 f(x) \cdot (x^2 + 1) dx = \int_{-1}^1 \frac{x}{x^2 + 1} \cdot (x^2 + 1) dx = \int_{-1}^1 x dx = \frac{x^2}{2} \Big _{-1}^1 =$ $= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>b)</b>	$\int_0^1 (x^2 + 1) e^x f(x) dx = \int_0^1 (x^2 + 1) e^x \cdot \frac{x}{x^2 + 1} dx = \int_0^1 x e^x dx = (x - 1) e^x \Big _0^1 =$ $= 0 - (-1) e^0 = 1$	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>c)</b>	$\int_0^a (f(x) - f(-x)) dx = \int_0^a \left( \frac{x}{x^2 + 1} - \frac{-x}{x^2 + 1} \right) dx = \int_0^a \frac{2x}{x^2 + 1} dx = \ln(x^2 + 1) \Big _0^a = \ln(a^2 + 1)$ $\ln(a^2 + 1) = \ln(2a) \Rightarrow a^2 + 1 = 2a$ , de unde obținem $a^2 - 2a + 1 = 0$ , deci $a = 1$ , care convine	<b>2p</b> <b>3p</b>