

**Examenul de bacalaureat național 2020**

**Proba E. c)**

**Matematică M\_st-nat**

**BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE**

**Varianta 3**

*Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii*

- Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

**SUBIECTUL I**

**(30 de puncte)**

1.	$r = a_3 - a_2 = 2$ $a_1 = a_2 - r = 1$	3p 2p
2.	$f(n) = n^2 - 1$ , deci $n^2 - 1 = 3 \Rightarrow n^2 - 4 = 0$ Cum $n$ este număr natural, obținem $n = 2$	3p 2p
3.	$x^2 - 9 = (x-1)^2 \Rightarrow 2x = 10$ $x = 5$ , care convine	3p 2p
4.	Numărul de submulțimi cu trei elemente ale mulțimii $\{1, 2, 3, 4\}$ este egal cu $C_4^3 = \frac{4!}{3! \cdot 1!} = 4$	3p 2p
5.	$m_{MN} = 1$ , $m_{PQ} = \frac{3-a}{3}$ $MN \parallel PQ$ , de unde obținem $m_{MN} = m_{PQ} \Leftrightarrow 3-a=3 \Leftrightarrow a=0$	2p 3p
6.	$\cos B = \frac{AB}{BC} \Leftrightarrow \frac{1}{2} = \frac{5}{BC}$ $BC = 10$	3p 2p

**SUBIECTUL al II-lea**

**(30 de puncte)**

1.a)	$A \cdot A = \begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix}$ , pentru orice numere reale $a$ și $b$ $\det(A \cdot A) = \begin{vmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{vmatrix} = a^2 b^2$ , pentru orice numere reale $a$ și $b$	3p 2p
b)	$X = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$ cu $x, y, z, t \in \mathbb{R} \Rightarrow A \cdot X = \begin{pmatrix} ax & ay \\ bz & bt \end{pmatrix}$ și $X \cdot A = \begin{pmatrix} ax & by \\ az & bt \end{pmatrix}$ $ay = by$ și $az = bz$ , deci $y(a-b) = 0$ și $z(a-b) = 0$ și, cum $a \neq b$ , obținem $y = z = 0$ , deci există numerele reale $x$ și $t$ astfel încât $X = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix}$	3p 2p
c)	$Y \cdot Y = A$ , deci $A \cdot Y = (Y \cdot Y) \cdot Y = Y \cdot (Y \cdot Y) = Y \cdot A$ , deci $Y = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$ , unde $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ $Y \cdot Y = \begin{pmatrix} \alpha^2 & 0 \\ 0 & \beta^2 \end{pmatrix}$ , deci $\begin{pmatrix} \alpha^2 & 0 \\ 0 & \beta^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ , de unde obținem $\alpha^2 = 4$ și $\beta^2 = 0$ , deci $Y = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ sau $Y = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ , care convin	2p 3p

<b>2.a)</b>	$3*3 = 3\sqrt{3+1} + 3\sqrt{3+1} = 3 \cdot 2 + 3 \cdot 2 = 6 + 6 = 12$	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>b)</b>	$x*0 = x \cdot \sqrt{0+1} + 0 \cdot \sqrt{x+1} = x$ , pentru orice $x \in M$ $0*x = 0 \cdot \sqrt{x+1} + x \cdot \sqrt{0+1} = x$ , pentru orice $x \in M \Rightarrow x*0 = 0*x = x$ , pentru orice $x \in M$	<b>2p</b> <b>3p</b>
<b>c)</b>	$(x^2 + 2x)\sqrt{3+1} + 3\sqrt{x^2 + 2x + 1} = 7 \Leftrightarrow 2(x^2 + 2x) + 3\sqrt{(x+1)^2} = 7 \Leftrightarrow 2x^2 + 7x - 4 = 0$ $x = -4$ , care nu convine, $x = \frac{1}{2}$ , care convine	<b>3p</b> <b>2p</b>

**SUBIECTUL al III-lea**

**(30 de puncte)**

<b>1.a)</b>	$f'(x) = x' \ln(x+1) + x(\ln(x+1))' =$ $= 1 \cdot \ln(x+1) + x \cdot \frac{1}{x+1} = \ln(x+1) + \frac{x}{x+1}$ , $x \in (-1, +\infty)$	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>b)</b>	$f''(x) = \frac{x+2}{(x+1)^2}$ , $x \in (-1, +\infty)$ $f''(x) > 0$ , pentru orice $x \in (-1, +\infty)$ , deci funcția $f$ este convexă	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>c)</b>	$\ln(x+1) \leq 0$ și $\frac{x}{x+1} \leq 0$ , pentru orice $x \in (-1, 0]$ , deci $f'(x) \leq 0$ , de unde obținem că $f$ este descrescătoare pe $(-1, 0]$ Pentru orice $x_1, x_2 \in (-1, 0]$ cu $x_1 \leq x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$ , deci $x_1 \ln(x_1+1) \geq x_2 \ln(x_2+1)$ de unde obținem $\ln(x_1+1)^{x_1} \geq \ln(x_2+1)^{x_2}$ , deci $(x_1+1)^{x_1} \geq (x_2+1)^{x_2}$ , adică $g(x_1) \geq g(x_2)$	<b>2p</b> <b>3p</b>
<b>2.a)</b>	$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (1-x^3) dx = \left[ x - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 =$ $= 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>b)</b>	$\int_0^1 x^2 (f(x))^3 dx = \int_0^1 x^2 (1-x^3)^3 dx = -\frac{1}{3} \int_0^1 (1-x^3)' (1-x^3)^3 dx = -\frac{1}{12} (1-x^3)^4 \Big _0^1 =$ $= 0 - \left( -\frac{1}{12} \right) = \frac{1}{12}$	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>c)</b>	$\int_0^1 (f(x))^{n+1} dx - \int_0^1 (f(x))^n dx = \int_0^1 (1-x^3)^{n+1} dx - \int_0^1 (1-x^3)^n dx = -\int_0^1 x^3 (1-x^3)^n dx$ , pentru orice număr natural nenul $n$ $x^3 \geq 0$ și $1-x^3 \geq 0$ , pentru orice $x \in [0, 1]$ , deci $\int_0^1 (f(x))^{n+1} dx - \int_0^1 (f(x))^n dx \leq 0$ , de unde obținem $\int_0^1 (f(x))^{n+1} dx \leq \int_0^1 (f(x))^n dx$ , pentru orice număr natural nenul $n$	<b>2p</b> <b>3p</b>