



Olimpiada Națională de Matematică

Etapa Județeană a Sectoarelor Municipiului București, 2025

CLASA a VI-a - soluții

Problema 1. Fie numerele naturale a, b, c pentru care numerele $m = \frac{5a + 6b + 7c + 6}{4a + 3b + 2c + 3}$ și $n = \frac{a + 2b + 3c + 5}{3a + b + 2c + 5}$ sunt simultan numere naturale.

- a) Arătați că $m \geq 2$.
- b) Determinați numerele m și n .

Soluție. a) Dacă $m \leq 1$, atunci $5a + 6b + 7c + 6 \leq 4a + 3b + 2c + 3$, adică $a + 3b + 5c + 3 \leq 0$, ceea ce nu se poate. Deci $m \geq 2$ **2p**

b) Nu putem avea $n \geq 2$, deoarece ar rezulta $a + 2b + 3c + 5 \geq 6a + 2b + 4c + 10$, deci $0 \geq 5a + c + 5$, fals. Cum $n > 0$, obținem $n = 1$ **1p**

Din $n = 1$ obținem $a + 2b + 3c + 5 = 3a + b + 2c + 5$, deci $b + c = 2a$ **1p**

Dacă, prin absurd, $m \geq 3$, ar rezulta $5a + 6b + 7c + 6 \geq 12a + 9b + 6c + 9$, de unde $c \geq 7a + 3b + 3$. Adunând b în ambii membri, obținem $b + c \geq 7a + 4b + 3$, adică $2a \geq 7a + 4b + 3$, deci $0 \geq 5a + 4b + 3$, fals. Așadar, $m < 3$, de unde, având în vedere punctul a), obținem $m = 2$ **2p**

Din $m = 2$ rezultă $5a + 6b + 7c + 6 = 8a + 6b + 4c + 6$, adică $c = a$ și cum $b + c = 2a$, deducem $a = b = c$. Așadar, $m = 2$ și $n = 1$, valori care se obțin pentru $a = b = c$. . . **1p**

Problema 2. Aflați numerele naturale nenule a și b pentru care

$$\frac{a}{(a, b)} = b + \frac{48 \cdot (a, b)}{[a, b]} \quad \text{și} \quad \frac{b}{(a, b)} = a - \frac{312 \cdot (a, b)}{[a, b]}.$$

Am notat cu (a, b) cel mai mare divizor comun al numerelor a și b , iar cu $[a, b]$ cel mai mic multiplu comun al numerelor a și b .

Gazeta Matematică

Soluție. Observăm că $a \geq \frac{a}{(a, b)} > b$ **1p**

Notăm cu $d = (a, b)$. Atunci $a = dx, b = dy, [a, b] = dxy$ cu $(x, y) = 1, x > y$. Obținem $x = dy + \frac{48}{xy}$ și $y = dx - \frac{312}{xy}$, (1).

Așadar, $xy \mid 48$ și $xy \mid 312 \Rightarrow xy \mid (48, 312) = 24$ **2p**

Continuarea 1.

Tot din (1) rezultă $xy(x - dy) = 48$ și $xy(dx - y) = 312 \Rightarrow \frac{x - dy}{dx - y} = \frac{48}{312} = \frac{2}{13} \Rightarrow x(13 - 2d) = y(13d - 2) \Rightarrow 13 - 2d > 0$ **1p**

- Avem de analizat cazurile: I. $d = 1 \Rightarrow 11x = 11y \Rightarrow a = b$, fals, deoarece $a > b$.
 II. $d = 2 \Rightarrow 3x = 8y$. Cum $(x, y) = 1$, obținem $x = 8, y = 3$, deci $a = 16, b = 6$ **1p**
 III. $d = 3 \Rightarrow 7x = 37y \Rightarrow x = 37, y = 7$, fals, deoarece $xy \nmid 24$.
 IV. $d = 4 \Rightarrow x = 10y \Rightarrow x = 10, y = 1$, fals, deoarece $xy \nmid 24$.
 V. $d = 5 \Rightarrow x = 21y \Rightarrow x = 21, y = 1$, fals, deoarece $xy \nmid 24$.
 VI. $d = 6 \Rightarrow x = 76y \Rightarrow x = 76, y = 1$, fals, deoarece $xy \nmid 24$ **2p**

Continuarea 2.

Din $xy \mid 24$ rezultă că $xy \in \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$, de unde rezultă (și se analizează) cazurile $(x, y) \in \{(2, 1), (3, 1), (4, 1), (6, 1), (3, 2), (8, 1), (12, 1), (4, 3), (24, 1), (8, 3)\}$.
 Obținem $x = 8, y = 3$, care implică $d = 2$ și soluția unică $a = 16, b = 6$ **4p**

Problema 3. Fie ABC un triunghi isoscel cu $\sphericalangle BAC = 30^\circ$ și $AB = AC$. Considerăm punctul D pe latura AC și punctele distincte E, F, G pe latura AB astfel încât $BC = BD = DE = EF$, iar $DG = DF$.

- a) Arătați că $BF = GE$.
 b) Aflați măsura unghiului BCG .

Soluție.

- a) $\triangle DFG$ isoscel $\Rightarrow \sphericalangle DFG = \sphericalangle DGF \Rightarrow \sphericalangle DFB = \sphericalangle DGE$ (1) **1p**
 $\triangle BDE$ isoscel $\Rightarrow \sphericalangle DBF = \sphericalangle DEG$ (2) **1p**
 Din (1),(2) și $BD = DE$, obținem $\triangle BDF \equiv \triangle EDG$ (L.U.U.) $\Rightarrow BF = GE$. . . **2p**
- b) $\triangle ABC$ isoscel $\Rightarrow \sphericalangle ABC = \sphericalangle ACB = \frac{180^\circ - \sphericalangle BAC}{2} = \frac{150^\circ}{2} = 75^\circ$ **1p**
 $BF = GE \Rightarrow BG = FE = BC \Rightarrow \triangle BCG$ isoscel **1p**
 Deci $\sphericalangle BCG = \sphericalangle BGC = \frac{180^\circ - \sphericalangle CBG}{2} = \frac{105^\circ}{2} = 52^\circ 30'$ **1p**

Problema 4. Determinați numerele naturale $n \geq 2$ cu proprietatea că n este divizibil cu fiecare dintre numerele

$$d_1, d_1 + d_2, \dots, d_1 + d_2 + \dots + d_{k-1},$$

unde $1 = d_1 < d_2 < \dots < d_{k-1} < d_k = n$ sunt toți divizorii naturali ai lui n .

Soluție. Numerele prime au proprietatea din enunț, deoarece, dacă n este număr prim, divizorii săi sunt $1 = d_1 < d_2 = n$, iar n este divizibil cu d_1 **1p**

Fie n un număr compus, având $k \geq 3$ divizori, cu proprietatea din enunț.

Presupunând că n este număr impar, toți cei k divizori ai săi sunt numere impare. Din ipoteză, n este divizibil cu $d_1 + d_2$, care este număr par, deci n ar trebui să fie tot număr par, contradicție. Așadar, n este număr par. **2p**

Atunci $d_1 = 1$, $d_2 = 2$, deci n este divizibil și cu $d_1 + d_2 = 3$, deci $d_3 = 3$. În plus, deducem că $6 \mid n$ **1p**

Deoarece, pentru orice divizor d al lui n , numărul $\frac{n}{d}$ este de asemenea un divizor al lui n , deducem că $\frac{n}{6}$, $\frac{n}{3}$ și $\frac{n}{2}$ se află printre cei k divizori ai lui n **1p**

Cum n este divizibil cu $d_1 + d_2 + \dots + d_{k-1}$, rezultă că $n \geq d_1 + d_2 + \dots + d_{k-1} \geq \frac{n}{6} + \frac{n}{3} + \frac{n}{2} = n$.

Deducem că singurii divizori ai lui n , mai mici decât n , sunt $\frac{n}{6}$, $\frac{n}{3}$ și $\frac{n}{2}$, deci $\frac{n}{6} = d_1 = 1$, $\frac{n}{3} = d_2 = 2$ și $\frac{n}{2} = d_3 = 3$, deci $n = 6$ este singurul număr compus cu proprietatea din enunț **2p**