

Examenul național de bacalaureat 2026
Proba E. c)
Matematică *M_șt-nat*
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

Model

Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii

- Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1.	$z_1 + 3iz_2 = 4 - 3i + 3i(1 - 2i) = 4 - 3i + 3i - 6i^2 = 4 + 6 = 10$	2p 3p
2.	$g(3) = 7, f(a) = 3 - a$, pentru orice număr real a $3 - a = 3a + 7$, de unde obținem $a = -1$	2p 3p
3.	$\log_4(x^2 + 4) = \log_4(5x)$, de unde obținem $x^2 - 5x + 4 = 0$ $x = 1$ sau $x = 4$, care convin	3p 2p
4.	Mulțimea numerelor naturale de două cifre are 90 de elemente, deci sunt 90 de cazuri posibile În mulțimea numerelor naturale de două cifre sunt 3 numere care au produsul cifrelor egal cu 4, deci sunt 3 cazuri favorabile, de unde obținem $p = \frac{3}{90} = \frac{1}{30}$	2p 3p
5.	$M(1,4)$ este mijlocul segmentului OA Cum M este mijlocul segmentului BC , obținem $a = 2$ și $b = 4$	2p 3p
6.	$BC = 2R = 8$, unde R este raza cercului circumscris triunghiului ABC $AB = \frac{BC}{2} = 4$	2p 3p

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1.a)	$A(6) = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A(6)) = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ -5 & 1 \end{vmatrix} = 5 \cdot 1 - (-5) \cdot 1 = 5 + 5 = 10$	3p 2p
b)	$A(3) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow A(3) \cdot A(3) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_2$ $2I_2 = aI_2$, de unde obținem $a = 2$	3p 2p
c)	$A(m) \cdot A(2) - A(m-1) = \begin{pmatrix} m-1 & 1 \\ 1-m & m-5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} m-2 & 1 \\ 2-m & m-6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & m-5 \\ 4-m & 22-5m \end{pmatrix}$, de unde obținem $N = (m-4)(m-5)$, pentru orice număr întreg m Cum $m-4$ și $m-5$ sunt numere întregi și $(m-4)(m-5) \geq 0$, obținem că numărul N este natural, pentru orice număr întreg m	3p 2p
2.a)	$f(0) = 0^3 + a \cdot 0^2 - 2 \cdot 0 + 2 = 0 + 0 - 0 + 2 = 2$, pentru orice număr real a	3p 2p
b)	$x_1x_2x_3 = -2$, $x_1 + x_2 + x_3 = -a$, $x_1x_2x_3(1 + x_1 + x_2 + x_3) = -2(1-a)$, pentru orice număr real a $-2(1-a) = 4$, de unde obținem $a = 3$	3p 2p

c)	$f(-1) = 0$, de unde obținem $a = -3$	2p
	$f = X^3 - 3X^2 - 2X + 2 = (X^2 - 2)(X - 3) - 4$, deci restul împărțirii lui f la $X^2 - 2$ este -4	3p

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

1.a)	$f'(x) = e^x(x^2 + x - 1) + e^x(2x + 1) =$ $= e^x(x^2 + x - 1 + 2x + 1) = e^x(x^2 + 3x), x \in \mathbb{R}$	3p 2p
b)	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + f(x)}{f'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x(x^2 + x)}{e^x(x^2 + 3x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x+1)}{x(x+3)} =$ $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1}{x+3} = \frac{1}{3}$	3p 2p
c)	$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -3$ sau $x = 0$; pentru orice $x \in (-\infty, -3]$, $f'(x) \geq 0$, deci f este crescătoare pe $(-\infty, -3]$ și, pentru orice $x \in [-3, 0]$, $f'(x) \leq 0$, deci f este descrescătoare pe $[-3, 0]$ $f(x) \leq f(-3)$, pentru orice $x \in (-\infty, 0]$ și, cum $f(-3) = \frac{5}{e^3}$, obținem $e^{x+3}(x^2 + x - 1) \leq 5$, pentru orice $x \in (-\infty, 0]$	3p 2p
2.a)	$\int_3^5 (f(x) - \sqrt{2x^2 + 1}) dx = \int_3^5 x dx = \frac{x^2}{2} \Big _3^5 =$ $= \frac{25}{2} - \frac{9}{2} = 8$	3p 2p
b)	$\int_1^2 \frac{x}{(f(x) - x)^2} dx = \int_1^2 \frac{x}{2x^2 + 1} dx = \frac{1}{4} \int_1^2 \frac{(2x^2 + 1)'}{2x^2 + 1} dx = \frac{1}{4} \ln(2x^2 + 1) \Big _1^2 =$ $= \frac{\ln 9}{4} - \frac{\ln 3}{4} = \frac{\ln 3}{4}$	3p 2p
c)	$V = \pi \int_0^2 g^2(x) dx = \pi \int_0^2 (3x^2 + 1 + 2x\sqrt{2x^2 + 1}) dx = \pi \left(x^3 \Big _0^2 + x \Big _0^2 + \frac{1}{2} \int_0^2 \sqrt{2x^2 + 1} \cdot (2x^2 + 1)' dx \right) =$ $= \pi \left(10 + \frac{(2x^2 + 1)\sqrt{2x^2 + 1}}{3} \Big _0^2 \right) = \frac{56\pi}{3}$, deci $\frac{a\pi}{3} = \frac{56\pi}{3}$, de unde obținem $a = 56$	2p 3p